



## CEREALI

### BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 1 DEL 29 MARZO 2012

#### **METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** Un flusso nord-occidentale in quota, associato ad una circolazione ciclonica d'aria fredda centrata sull'Europa nord-orientale, indebolisce l'alta pressione che da giorni porta sul Veneto tempo stabile e soleggiato con temperature ben sopra la norma. Farà un po' più fresco specie a fine periodo, quando potrà verificarsi qualche episodio d'instabilità.

**Tempo previsto:** Cielo da sereno a poco nuvoloso, in prevalenza per nubi alte in transito. Temperature ben sopra la norma del periodo. Moderati rinforzi di vento in prevalenza dai quadranti nord-occidentali, un po' più sensibili sulle zone centro-meridionali e soprattutto verso sera in quota, con possibili episodi di Foehn nelle valli e localmente sulle zone pedemontane.

**Venerdì:** Sulle zone montane tempo leggermente variabile, con annuolamenti alternati a spazi di sereno; altrove cielo al più poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature contenute variazioni di carattere locale nei valori minimi; massime stazionarie o in leggero calo; valori termici ancora ben sopra la norma, specie nelle ore diurne

**Sabato:** Generalmente sereno, salvo sporadici modesti annuolamenti.

**Precipitazioni:** assenti.

**Temperature:** minime stazionarie o in contenuto calo, massime senza notevoli variazioni.

**Domenica:** Tempo parzialmente soleggiato, con probabilità nelle prime ore di qualche riduzione della visibilità in pianura e dal pomeriggio di locali addensamenti nuvolosi, associati alla possibilità di qualche rovescio o temporale specie sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in moderato calo.

**Riprende** con questa settimana, da parte dell'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli", **il bollettino fitosanitario dei Cereali a paglia.**

#### **Fumento tenero ed altri cereali a paglia**

Il **frumento** è nella **fase di accestimento-inizio levata**, mentre le varietà **precoci sono già in levata**. Le colture presentano uno **sviluppo vegetativo** rigoglioso, con piante molto accestite, favorite dall'andamento stagionale, dalla prima concimazione azotata e dal limitato dilavamento di azoto determinato dalla scarsità di precipitazioni. La carenza di piogge si protrae ormai da tempo e nelle prossime settimane sarà questo l'aspetto su cui incentrare l'attenzione.

In quest'ultima settimana di marzo si può effettuare il **diserbo su frumento tenero, duro e orzo** contro le **dicotiledoni**, con prodotti a base di Tribenuron-metile + Tifensulfuron-metile

(Granstar Ultra Sx, Marox SX, Nimble) oppure Tribenuron-metile + Metsulfuron-metile (Traton SX) attivi contro **crucifere, camomilla, stellaria, papavero e vicia**. In alternativa si può utilizzare Tribenuron-metile + MCP-P (Granstar Power SX) per allargare l'azione sugli **ecotipi più resistenti di papavero, su galium ai primi stadi di crescita, fumaria e veronica**. Nel caso di **forti infestazioni di fallopia e galium**, si possono utilizzare prodotti a base di Floroxipir (Tomagan, Tomahawk), o Florasulam + Fluroxipir (Starane Gold, Kicker, Floranet).

Con **infestazioni miste (dicotiledoni e graminacee)**, su **frumento tenero e duro**, si possono impiegare prodotti a base di Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpir (Hussar Max, Cossak), oppure Iodosulfuron + Fenoxaprop-p-etile + Mefenpir (Puma Gold), attivi contro varie dicotiledoni e varie graminacee entro lo stadio di levata (avena e alopecurus).

**Prossimo bollettino giovedì 5 aprile**