



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.11 DEL 06 GIUGNO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Fino a venerdì l'anticiclone subtropicale africano interesserà marginalmente il Veneto; il tempo sarà variabile con più zone di sereno in pianura e nuvole maggiormente presenti in montagna, dove sarà più probabile qualche precipitazione specie durante le ore pomeridiane, e temperature in risalita verso valori superiori alla media. Tra sabato e domenica probabile transito di una perturbazione atlantica; di conseguenza le condizioni meteorologiche diverranno instabili e i valori termici scenderanno.

Tempo previsto: in pianura cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso ma a tratti nuvoloso più probabilmente sulle zone prossime ai rilievi, dove localmente sarà possibile qualche breve piovasco o rovescio durante le ore pomeridiane; in montagna cielo perlopiù nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con possibilità di locali piovaschi o brevi rovesci.

Giovedì: Cielo: in pianura in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente in prossimità dei colli e dei monti; in montagna alternanza di annuvolamenti e schiarite.

Precipitazioni: probabilità bassa (5-25%); solo su rilievi e zone limitrofe sarà possibile qualche breve piovasco o rovescio specie nel pomeriggio.

Temperature: in pianura di notte e al mattino senza variazioni di rilievo, da metà giornata in aumento leggero o moderato; in montagna in lieve aumento.

Venerdì: Cielo: fino a metà giornata generalmente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: probabilità bassa (5-25%); solo su rilievi e zone limitrofe sarà possibile qualche breve piovasco, rovescio o temporale tra il pomeriggio e la sera.

Temperature: in aumento leggero o moderato.

Sabato: zone di sereno prevalenti fino a metà giornata e nuvolosità in aumento dal pomeriggio specie sui rilievi, dove saranno più probabili piovaschi, rovesci o temporali; le temperature in pianura risulteranno di notte e non avranno variazioni di rilievo di giorno, mentre in montagna diminuiranno.

Le coltivazioni di frumento più tardive si trovano tra la **fine di maturazione lattea e l'inizio di maturazione cerosa** della granella con l'apparato fogliare ancora verde. **Le coltivazioni più precoci** sono in fase di **fine maturazione cerosa** ma non ancora consistente della granella, mentre l'apparato fogliare della pianta inizia ad ingiallire.

Le colture che si presentano ancora verdi, sono generalmente quelle trattate all'inizio della spigatura con prodotti antiparassitari (fungicidi e insetticidi) e coltivate con maggiore disponibilità azotata fino alla spigatura. Queste manifestano

una maggiore sanità e una colorazione ancora molto verde dell'ultima foglia nei confronti delle colture non trattate o coltivate in condizioni di minor fertilità del terreno. Queste ultime hanno ormai una ridotta attività fotosintetica causata da attacchi di **Septoria e Afidi** che ormai sono presenti anche sulla spiga.

Rispetto gli scorsi anni il frumento e l'orzo sono stati più colpiti dall'allettamento. Le colture maggiormente danneggiate sono quelle in successione alla patata e alla bietola. In ogni caso l'allettamento è aggravato dalle semine troppo fitte e dall'epoca di semina più anticipata.

Prossimo bollettino mercoledì 13 giugno