



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 17 DEL 8 AGOSTO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Il protendersi in quota di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa verso l'Europa meridionale ostacola gli effetti di un'area depressionaria; quest'ultima insiste sull'Europa settentrionale e comunque nei prossimi giorni, traslando verso Sud-Est, porterà una lieve curvatura ciclonica sulla nostra regione con aria un po' più fresca. Avremo ampi spazi di sereno, intervallati da qualche fase di variabilità che sulle zone montane risulterà un po' più significativa e porterà qualche locale precipitazione specie a inizio periodo.

Tempo Previsto: in pianura, cielo da sereno a poco nuvoloso; in montagna tempo prevalentemente soleggiato, ma con nubi sparse specie sulle Dolomiti, ove sarà più probabile qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; Bora moderata sulla costa e a tratti anche su parte della pianura.

Giovedì: in pianura tempo in prevalenza soleggiato, ma a tratti con qualche annuvolamento, in particolare a fine giornata sulla fascia pedemontana; sulle zone montane tempo variabile, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, localmente intensi specie nella seconda parte della giornata. **Precipitazioni:** nelle prime ore generalmente assenti, poi probabilità in aumento specie nel pomeriggio fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su fascia pedemontana ed aree adiacenti, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, al più sporadici altrove; non si esclude qualche fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane, specie orientali. **Temperature:** minime senza notevoli variazioni, massime perlopiù in lieve calo.

Venerdì: Cielo: tempo in prevalenza soleggiato, specie in pianura, salvo locali annuvolamenti di carattere temporaneo.

Precipitazioni: eventuali brevi precipitazioni di carattere locale più che altro nel pomeriggio, con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) su Dolomiti e fascia pedemontana, nulla o molto bassa (0-5%) altrove. Temperature: minime in calo specie sulle zone centro-settentrionali, massime stazionarie o in lieve calo salvo locali leggeri aumenti nelle valli.

Riso

Lo stadio del riso Vialone Nano è di spigatura per i culmi principali nelle risaie più anticipate e di inizio spigatura in quelle più tardive. Il Carnaroli non ha ancora iniziato la spigatura. Oltre ad un ritardo rispetto la media stagionale, le piante presentano generalmente uno sviluppo contenuto. Sotto quest'ultimo aspetto, le colture risentono dell'andamento climatico con alte temperature. Solo nelle colture più sostenute con una concimazione allo stadio di levata si nota un buon rigoglio vegetativo.

Dal punto di **vista fitosanitario**, l'andamento climatico non è stato favorevole alla diffusione di

malattie fungine e non si sono ancora rilevate infezioni di brusone. Gli interventi contro questa malattia si devono comunque eseguire per il Vialone Nano e nelle risaie maggiormente soggette di Carnaroli.

Per il Vialone Nano nel corso della settimana è opportuno intervenire sia nelle risaie già trattate preventivamente che in quelle non ancora trattate, con prodotti specifici anche in miscela tra loro, a base di Azoxystrobin e di Flutriafol (Impact 250 SC), entrambi con 28 giorni di carenza. Quest'ultimo non è ammesso dalle linee di difesa integrata.

Con gli stessi prodotti, nella prossima settimana è opportuno intervenire sulle risaie di Carnaroli più sensibili alla malattia.

Si comunica che per la prossima settimana il bollettino verrà sospeso e riprenderà regolarmente mercoledì 29 agosto