



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 5 DEL 26 APRILE 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Fino a sabato l'avvicinamento dell'anticiclone subtropicale africano sul Veneto porterà cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori molto sopra la media specie sui monti e nelle ore diurne. Da domenica pressione in calo ed umidità in arrivo da sud-ovest.

Tempo previsto: Precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature sopra la media, leggermente in pianura e moderatamente in montagna. Venti forti da sud-ovest in alta montagna.

Venerdì: Sereno o poco nuvoloso, ma in pianura con qualche foschia o nebbia durante le ore notturne e del primo mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, prevalentemente moderato in pianura e sensibile in montagna.

Sabato: Sereno o poco nuvoloso, ma in pianura con qualche foschia o nebbia durante le ore notturne e del primo mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento prevalentemente moderato e localmente sensibile, con valori molto sopra la media specie durante le ore diurne.

Domenica: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso dal pomeriggio con possibilità di qualche pioggia. Temperature in aumento di notte ed in calo di giorno.

Fumento tenero ed altri cereali a paglia

Lo stadio del frumento varia da allungamento dell'ultimo internodo a pre-botticella, in funzione della precocità. Le colture sono in **leggero anticipo** rispetto la media stagionale con buono stato vegetativo, grazie al decorso stagionale favorevole fin dalla fase di accostamento. **Non si riscontrano malattie fungine**, in particolare la Septoria tritici, malattia fungina già presente negli scorsi anni in questo periodo. Pertanto, in questa settimana **non si consigliano trattamenti** specifici rimandando alla fase di botticella eventuali interventi. Nelle colture che necessitano della **seconda concimazione azotata**, interrotta dalle ultime piogge, si raccomanda di intervenire con le modalità descritte nei precedenti bollettini. Oltre a queste colture, quest'anno sono diversi gli appezzamenti che dimostrano un eccessivo rigoglio. In queste condizioni per il momento non si consiglia alcun intervento, in quanto un apporto azotato potrebbe avere ripercussioni negative per l'allettamento e lo stato sanitario delle piante.

Riso con semina interrata

Riprende la difesa integrata di questa coltura che sarà effettuata ogni tre settimane.

I terreni sono pronti per la semina e solo in alcuni casi è stato possibile effettuarla a causa delle condizioni meteo. Per quanto riguarda la concimazione di pre-semina, questa prevede apporti di **Azoto** da poche unità a 40 per ettaro, per il **Fosforo** dalle 30 alle 50 unità/ha e per il **Potassio** dalle 90 alle 120 unità/ha. Relativamente alla **gestione delle infestanti**, in alcune situazioni è necessario un intervento di **rinettamento** che potrà essere effettuato o mediante una **lavorazione meccanica o con il diserbo di pre-semina** con prodotti a base di Glifosate (Vari) in miscela, per allargare l'azione contro il Riso Crodo, con prodotti a base di Cicloxidim (Stratos ultra); quest'ultimo p.a. **non è ammesso dalle linee di difesa integrata regionali**.

In pre-emergenza si consiglia di impiegare la s.a. Pendimentalin e nelle risaie con maggior presenza di giavoni, al Pendimentalin può essere abbinata la s.a. Clomazone.

Prossimo bollettino giovedì 03 maggio