



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 6 DEL 3 MAGGIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Una graduale moderata intensificazione del flusso umido da sud-ovest in quota favorisce un progressivo incremento della variabilità a partire dalle zone montane. Tenderà ad aumentare anche la probabilità di precipitazioni dapprima in montagna e poi anche in pianura, specie a fine periodo.

Tempo previsto: Tempo perlopiù soleggiato, ma con degli annuvolamenti che dapprima saranno di carattere locale e poi si presenteranno sparsi soprattutto in montagna. Possibilità di qualche locale piovasco o breve rovescio sulle zone montane e pedemontane.

Venerdì: In pianura da poco a parzialmente nuvoloso, in montagna tempo variabile con spazi di sereno anche ampi fino al mattino e più annuvolamenti sparsi in seguito. Precipitazioni qualche piovasco o breve rovescio nelle ore più calde con probabilità al più media (40/60%) sulle zone montane centro-orientali e sulla pedemontana trevigiana, medio-bassa (20/40%) sulle altre zone pedemontane, bassa (0/20%) altrove. Temperature contenute variazioni di carattere locale.

Sabato: Condizioni di variabilità, con schiarite più significative in pianura, maggiori addensamenti nuvolosi sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni probabili fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento in quota e senza notevoli variazioni altrove; massime in moderato calo.

Domenica: Tempo variabile, a tratti instabile, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi. Precipitazioni sparse, con rovesci e temporali. Variazioni perlopiù contenute e di carattere locale nei valori termici.

Il frumento è nella fase di inizio spigatura per le colture più precoci e di botticella per quelle più tardive. Il decorso stagionale dell'ultimo periodo è stato fresco, ma nel complesso le coltivazioni risentono positivamente della stagione favorevole e delle ultime concimazioni azotate.

Sotto l'aspetto fitosanitario non si riscontrano particolari attacchi di malattie fungine. Solo sulle foglie basali si nota qualche infezione di **Septoria**. Questo fungo può colpire le foglie e la spiga. Compare con tacche bruno scuro ed è favorito da un andamento climatico con frequenti bagnature e basse temperature, in condizioni di elevata fertilità del terreno e di fittezza delle colture.

In considerazione dell'elevato rigoglio vegetativo della maggior parte delle colture di frumento,

nella fase di inizio spigatura si consiglia di effettuare **un trattamento preventivo** contro le malattie che possono colpire l'apparato fogliare e successivamente la spiga, quali **Oidio, Septoria, Ruggini e Fusariosi**. I prodotti da utilizzare sono a base di Azoxystrobin (Vari) Pyraclostrobin (Comet 250 EC), Propiconzolo (vari), Tetraconazolo (vari), Tebuconazolo (vari), Epossiconazolo+Pyraclostrobin (Opera) o Protioconazolo+Tebuconazolo (Prosaro). I p.a. Epossiconazolo e Protioconazolo non sono ammessi dalle linee di difesa integrata della Regione Veneto, così come i prodotti a base di Tebuconazolo classificati XN – Nocivo.

In questi giorni si rilevano **attacchi di Afidi** sulle colture e nei casi di forte presenza si consiglia di aggiungere al fungicida prodotti a base di Pirimicarb o Fluvalinate.

Prossimo bollettino mercoledì 9 maggio