



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 7 DEL 9 MAGGIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: L'espansione di un promontorio anticiclonico dall'Africa nord-occidentale favorisce qualche giorno di tempo stabile e perlopiù soleggiato, con temperature che si porteranno su valori anche ben superiori alla norma. A fine periodo, una massa d'aria fredda si avvicinerà dal Nord Europa portando una fase d'instabilità, con rovesci sparsi e probabili temporali.

Tempo previsto: Tempo parzialmente soleggiato, con ampi spazi di sereno alternati a qualche velatura in transito e a degli annuvolamenti cumuliformi in montagna specie verso nord. Sulle zone montane e in particolare sulle Dolomiti sarà probabile qualche locale precipitazione, di modesta entità salvo occasionali brevi rovesci.

Giovedì: Sereno o poco nuvoloso, salvo modesti locali addensamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature contenute variazioni di carattere locale nei valori minimi, moderato aumento di quelli massimi.

Venerdì: sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni pressochè assenti. Temperature in moderato aumento. Osservazioni valori termici ben superiori alla norma.

Sabato: Sulle zone pianeggianti tempo dapprima soleggiato e poi variabile, con instabilità e nuvolosità più estesa a fine giornata; su quelle montane, tempo da variabile a instabile con spazi di sereno soprattutto all'inizio sulle Prealpi e nubi più diffuse in seguito. Crescente probabilità di precipitazioni dapprima in montagna e infine anche in pianura, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in moderato aumento, massime in calo in montagna e pressochè stazionarie altrove.

Fumento tenero ed altri cereali a paglia

Il frumento è nella fase di completamento della spigatura per le colture più tardive e di fioritura per quelle più precoci. Il decorso stagionale è favorevole con temperature miti che favoriscono un buon sviluppo delle ultime foglie, stelo e spiga.

L'orzo ha completato la fioritura e non si notano particolari avversità e allettamenti.

Sotto l'aspetto fitosanitario in alcune colture di frumento molto rigogliose, nella parte mediana della pianta si può notare qualche infezione di Septoria. **Per le coltivazioni di frumento particolarmente fitte e non ancora trattate**, si consiglia di effettuare un **trattamento preventivo contro le malattie fungine** (Septoria, Ruggine e Fusariosi). **I prodotti da utilizzare in fase di completamento della spigatura** sono a

base di Pyraclostrobin (Comet 250) Azoxystrobin (Vari), Flutriafol (Vari), Tetraconazolo (Vari).

In fase di inizio fioritura sono da preferirsi Propiconzolo (Vari), Tebuconazolo (Vari), Ciproconazolo+Procloraz (Vari) e, non ammessi dalle linee di difesa integrata della Regione Veneto, Epossiconazolo+Pyraclostrobin (Opera) o Protiocanazolo+Tebuconazolo (Prosaro). Questi prodotti sono più efficaci contro la Fusariosi della spiga, malattia che può facilmente diffondersi in questo stadio di inizio fioritura, in caso di piogge.

Nei casi di forte presenza di Afidi, si consiglia di aggiungere al trattamento fungicida prodotti a base di Pirimicarb o Fluvalinate, evitando di fare questo abbinamento al trattamento fungicida in fase di fioritura.

Prossimo bollettino mercoledì 16 maggio