



PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"



CEREALI

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.8 DEL 16 MAGGIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Dopo il passaggio mercoledì di una rapida perturbazione seguirà la rimonta di una vasto campo anticlonico sul Mediterraneo; domenica avvicinamento di una perturbazione da Ovest. Da giovedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato con progressivo aumento delle temperature; domenica variabilità con possibilità di qualche precipitazione. **Fenomeni particolari:** Giovedì valori termici sotto la media del periodo, specie nei valori minimi con gelate sulle zone montane non interessate da Foehn.

Tempo previsto: Inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo residua nuvolosità sui settori orientali in attenuazione; in seguito ampi tratti di sereno con locali addensamenti nuvolosi, specie sui settori prealpini. Nelle prime ore del pomeriggio residue precipitazioni sulla costa e settori orientali della pianura, in seguito possibili locali precipitazioni su Prealpi e zone pedemontane. Fenomeni in esaurimento a fine giornata. Clima fresco con temperature massime in calo e sotto la media del periodo. In pianura nelle prime ore del pomeriggio venti sostenuti da Nord-Est su costa ed entroterra limitrofo; in seguito attenuazione della ventilazione che diverrà debole e dai quadranti meridionali. Sulle zone montane venti sostenuti da Nord con episodi di Foehn nelle valli e localmente sulla pedemontana.

Giovedì: Sereno o poco nuvoloso, per passaggio di nubi alte dalla serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione salvo risultare in aumento in quota; massime in aumento.

Venerdì: Parzialmente nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti salvo probabilità bassa (5-25%) di fenomeni locali sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento; massime senza variazioni di rilievo, in aumento in quota.

Sabato: Sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio probabili locali addensamenti nuvolosi con possibili locali precipitazioni specie sui settori occidentali.

Frumento tenero ed altri cereali a paglia

Il frumento è nella fase di fine fioritura per le colture tardive e di inizio formazione della cariosside per quelle precoci, mentre l'orzo è allo stadio di maturazione latte della granella.

Il frumento in questa fase ha ormai raggiunto lo sviluppo e la sua altezza definitivi. Quest'anno si presenta particolarmente fitto e di taglia elevata nelle colture in successione alla patata e con taglia più contenuta per quelle dopo il mais. Lo sviluppo vegetativo è comunque buono per tutte le colture, favorito dall'andamento climatico caratterizzato nelle ultime settimane da qualche utile precipitazione. La pioggia e il vento di questo fine settimana hanno provocato **qualche allettamento**, con intensità maggiore nelle colture di orzo e in quelle di frumento più fitte.

Sotto il profilo fitosanitario non si registrano particolari infezioni fungine, eccetto qualche attacco di **Septoria** ed ancora una certa presenza di **Afidi** nelle colture non trattate. Dove è stato eseguito il trattamento antiparassitario all'inizio della spigatura, le colture si presentano sane, con una buona e più completa attività fogliare. In

particolare nelle coltivazioni allettate in questi giorni, il trattamento effettuato contro i vari parassiti della foglia e della spiga risulta ancora più utile per prevenire focolai di malattie fungine e precoci appassimenti fogliari.

Riso con semina interrata

La fase fenologica della coltura è di emergenza quasi ovunque completata. Nelle semine più anticipate, lo stadio è generalmente di due foglie. Per quanto riguarda il **controllo delle infestanti**, è stato eseguito quasi ovunque il diserbo in pre-emergenza con la s.a. Pendimentalin. In alcuni casi, però, in funzione anche dei giorni intercorsi dalla semina al trattamento erbicida, l'azione antigerminello del Pendimentalin, è stata in parte limitata dalla rapida nascita delle infestanti, quest'ultima favorita dall'andamento meteo che si è verificato tra fine aprile ed inizio maggio.

Nel prossimo bollettino si daranno le indicazioni relative al diserbo di post-emergenza, da effettuarsi prima dell'immissione di acqua nelle risaie.

Prossimo bollettino riso mercoledì 30 maggio

Prossimo bollettino mercoledì 23 maggio