



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 10 DEL 17 LUGLIO 2014

METEEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti pomeridiani. Sarà possibile qualche locale rovescio o temporale specie sulle zone montane e pedemontane, e non si esclude qualche precipitazione anche sulla pianura specie centro-settentrionale dalla sera.

Venerdì: Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti sparsi a partire da metà giornata. Precipitazioni: Dalle ore pomeridiane probabilità bassa (5-25%) di qualche breve rovescio o temporale sulle zone montane e pedemontane e non si esclude qualche isolata breve precipitazione sulla pianura interna. Temperature: Valori stabili o in lieve aumento.

Sabato: Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti più probabili nella seconda parte della giornata in montagna. Precipitazioni: Generalmente assenti. Temperature: Valori stazionari o in lieve ulteriore aumento, con valori di qualche grado sopra le medie del periodo.

Domenica: In pianura tempo inizialmente soleggiato, con maggiore nuvolosità dalle ore pomeridiane. In montagna condizioni di variabilità, con spazi di sereno al mattino e addensamenti nuvolosi via via più diffusi. Crescente probabilità di precipitazioni dalle ore centrali, a partire dalle zone montane e occidentali, perlopiù a carattere di rovescio o temporale. Temperature stabili o in lieve aumento, salvo le massime in lieve calo sui rilievi.

Andamento meteo-climatico: La fase di maltempo che ha interessato la Provincia tra sabato e lunedì ha prodotto precipitazioni comprese tra 30 e 80 mm nel settore pedemontano e nei Lessini, 20-50 mm nei colli Berici. Le temperature continuano a mantenersi inferiori rispetto alla norma di 3°C sui valori massimi e di 1-2°C su quelli minimi.

Fase fenologica: indurimento nocciolo-ingrossamento drupe.

Situazione fitosanitaria: In questa settimana è stata completata l'installazione delle trappole per il monitoraggio dei voli della **mosca olearia**. Le presenze di adulti in tutti i comprensori sono ancora molto alte e, dove non è stato fatto il trattamento, la percentuale di punture fertili (uova e larve) rimane sopra la soglia di danno dell'8-10%.

Difesa: Per coloro che praticano la difesa larvicida e che non hanno ancora effettuato il

trattamento consigliato la scorsa settimana è necessario che lo facciano al più presto con prodotti a base di Fosmet o Dimetoato o Imidacloprid (per quest'ultimo max 1 intervento/anno). Per coloro che utilizzano prodotti a base di esche avvelenate con spinosad (es. Spintor Fly) è consigliabile proseguire con i trattamenti alla cadenza stabilita (8-10 giorni) o anche prima a seguito di piogge dilavanti.

Per coloro che usano metodi di lotta adulticidi come le trappole **attract & kill** (Eco-trap, Magnet oli, ecc.) o di **cattura massale** (Omeotrap, Tap-trap), è necessario provvedere rapidamente all'installazione dei dispositivi. Le trappole vanno posizionate a due-tre metri d'altezza, nella parte della chioma esposta a sud. Il numero di dispositivi da impiegare varia a seconda della densità dell'oliveto e della pericolosità storica dell'insetto, in numero di uno per pianta o di uno ogni due piante.

Prossimo bollettino giovedì 24 luglio