



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 13 DEL 7 AGOSTO 2014**

**METEEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Giovedì:** Inizialmente in prevalenza soleggiato in pianura salvo locali annuvolamenti, nel corso del pomeriggio/sera graduale aumento della nuvolosità cumuliforme specie sui settori nord e nord-orientali. Su zone montane e pedemontane schiarite si alterneranno ad annuvolamenti, più frequenti verso sera. A partire dalle ore centrali sulle zone montane e pedemontane aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di qualche locale rovescio o temporale in possibile sconfinamento su parte della pianura limitrofa; sul resto della pianura precipitazioni generalmente assenti anche se non si esclude qualche locale precipitazione sui settori nord-orientali.

**Venerdì:** Cielo: In pianura in prevalenza soleggiato salvo locali annuvolamenti al primo mattino; sulle zone montane e pedemontane nelle prime ore probabile nuvolosità bassa in seguito ampie schiarite si alterneranno a nuvolosità via via più frequente nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: In pianura in prevalenza assenti; sulle zone montane e pedemontane a partire dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci od occasionali temporali. Temperature: Senza variazioni di rilievo o in lieve calo i valori minimi in montagna.

**Sabato:** Cielo: In pianura tempo in prevalenza soleggiato al mattino, a partire dalle ore più calde aumento della nuvolosità; in montagna cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con schiarite più probabili al mattino. Precipitazioni: Al mattino precipitazioni assenti in pianura mentre sulle zone montane e pedemontane aumenterà gradualmente la probabilità di qualche rovescio o temporale (probabilità medio-bassa 25-50%). Nel corso del pomeriggio su zone montane e pedemontane ulteriore aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio-alta 50-75%). In pianura a partire dai settori settentrionali e verso sera anche altrove, probabili locali fenomeni (probabilità medio-bassa 25-50%). Temperature: Minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

**Domenica:** Schiarite, anche ampie in pianura, alternate ad addensamenti nuvolosi più frequenti in montagna nel corso del pomeriggio. Su zone montane e pedemontane sarà probabile qualche precipitazione, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in pianura fenomeni generalmente assenti.

**Andamento meteo-climatico:** Nelle giornate di domenica e martedì u.s. alcuni temporali hanno interessato il territorio in modo irregolare. Le precipitazioni sono state comprese tra 6 e 48 mm (punte massime a Bassano e Brendola). Nella giornata di domenica un evento grandinigeno ha interessato la zona olivicola compresa tra Castegnero-Nanto e Selva di Montebello causando un danno da cascola del 10-20%. Le temperature sono state inferiori alla media di 2-3°C sui valori massimi e di 1°C su quelli minimi.

**Fase fenologica:** seconda fase di ingrossamento delle drupe.

**Situazione fitosanitaria:** Anche questa settimana le catture di **mosca** sono state molto irregolari in tutti i comprensori. Ciò nonostante la presenza media del parassita è alquanto elevata (fino a 80 catture per trappola). I controlli eseguiti sulle

olive raccolte in appezzamenti precedentemente trattati non evidenziano presenze di uova o larve attive.

**Difesa:** Visto l'elevato numero di individui di mosca e tenuto conto che l'azione del precedente trattamento si è esaurita, **si consiglia di effettuare, a inizio della prossima settimana e per tutte le zone olivicole, un trattamento larvicida con prodotti a base di Dimetoato o Fosmet o Imidacloprid.** Chi utilizza prodotti a base di esche avvelenate con spinosad (es. Spintor Fly) deve invece proseguire con i trattamenti alla cadenza stabilita (8-10 giorni) o anche prima a seguito di piogge dilavanti. Negli oliveti colpiti da grandine si consiglia di intervenire tempestivamente con prodotti a base di rame al fine di contrastare l'insorgere della rogna laddove la vegetazione è stata danneggiata.

**Si comunica che per la prossima settimana il bollettino verrà sospeso e riprenderà regolarmente giovedì 21 agosto**