



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 2 DEL 5 APRILE 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Fino a venerdì un nucleo depressionario centrato sulla Penisola Iberica determina un afflusso di aria umida e moderatamente instabile da Sud apportando nuvolosità, a tratti diffusa, e precipitazioni sparse. Da sabato la circolazione cambierà per l'influenza di una perturbazione sull'Europa Nord-Orientale, che porterà episodi di instabilità sabato e un successivo calo termico.

Tempo previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, specie su Prealpi e pianura centro-orientale. Temporanei rinforzi dei venti da Sud-Est sulla costa nel primo pomeriggio. Limite della neve intorno a 1900/2100m.

Venerdì: Sulle zone montane in prevalenza molto nuvoloso; in pianura nuvolosità irregolare con schiarite, specie sui settori sud-occidentali, alternate ad annuvolamenti, più frequenti su costa e settori orientali. Precipitazioni: fino al mattino fenomeni sparsi con probabilità medio-alta (60/80%) sulle zone centro-settentrionali e medio-bassa altrove (20/40%). In seguito aumento della probabilità fino ad alta (80/100%) di rovesci e temporali in prossimità dei rilievi, su pianura nord-orientale e costa, altrove probabilità bassa (0/20%) di locali e brevi fenomeni. Limite della neve intorno ai 1800-2000m localmente più in basso in occasione di rovesci/temporali. Temperature: generalmente stazionarie, salvo locali aumenti dei valori massimi in pianura.

Sabato: Sulle zone montane in prevalenza molto nuvoloso. In pianura nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad annuvolamenti, a tratti consistenti, specie sui settori orientali e costieri. Precipitazioni fino al mattino sparse con rovesci e temporali più frequenti sui settori orientali della pianura e sui rilievi. Dopo una parziale attenuazione durante le ore centrali con fenomeni locali e più discontinui, seguirà una nuova fase di instabilità con precipitazioni frequenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Limite della neve inizialmente intorno a 1800-2000m in abbassamento dalla serata fino a 1200-1400m.

Temperature minime in calo anche sensibile in montagna, massime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione.

Domenica: Moderata variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti più consistenti su Prealpi e pianura. Possibilità di qualche piovasco o rovescio nelle ore centrali sulla pedemontana e Prealpi. Temperature in calo, anche sensibile in montagna.

Patata

La fase fenologica è di pre-emergenza ed in alcune rare situazioni si osserva già il primo inizio di emergenza. Le operazioni di rincalzatura e di concimazione sono ormai terminate, pertanto si consiglia di **procedere con il diserbo di pre-emergenza con sollecitudine**.

Per infestazioni con prevalenza di **Dicotiledoni**, le sostanze attive da impiegarsi in miscela sono le seguenti: Pendimetalin + Clomazone + Metribuzin oppure, per **infestazioni miste con prevalenza di graminacee**: Flufenacet + Metribuzin.

Nelle miscele estemporanee, i dosaggi ad ettaro dovranno essere quelli minimi indicati nelle etichette del formulato commerciale.

Cipolla a semina primaverile

Lo **stadio** è quasi ovunque di **prima foglia vera**; per quanto riguarda lo **sviluppo vegetativo**,

questo non sembra aver subito un incremento rispetto alla scorsa settimana. Pertanto, per favorire la coltura, in assenza di precipitazioni, si consiglia di intervenire con un'**irrigazione preceduta da una concimazione azotata**. Relativamente al **controllo delle infestanti**, effettuare il **primo intervento con le microdosi** con prodotti a base di Ioxinil alla dose di 0,1 l/ha su colture con prima foglia vera ben sviluppata.

Cipolla a semina autunnale

La fase fenologica va da 4 a 6 foglie in funzione degli appezzamenti. I seminati in alcune situazioni risultano irregolari; in questi casi procedere con una concimazione azotata, se non già effettuata, per favorire lo sviluppo vegetativo. Proseguire con il 2° intervento a dose ridotta a base di Ioxinil (0,25 l/ha) per il controllo delle **infestanti**.

Prossimo bollettino giovedì 12 aprile