



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 22 DEL 29 AGOSTO 2012

METEO VENETO a

Evoluzione generale: Fino a buona parte di giovedì il campo anticiclonico attualmente presente sul Mediterraneo garantirà condizioni di prevalente stabilità sul Veneto; in seguito l'avvicinarsi e successivo passaggio venerdì di una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento con precipitazioni anche diffuse e marcato calo termico. Seguirà variabilità.

Tempo Previsto: in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte; in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con sviluppo di modesta attività cumuliforme che non si esclude possa dare luogo a qualche breve precipitazione. Temperature massime in lieve aumento. Venti a regime di brezza sulla costa e nelle valli.

Giovedì: Cielo progressivo aumento della nuvolosità nel corso della mattinata in ingresso da Ovest con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti al mattino, aumento della probabilità nel corso del pomeriggio di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con probabilità medio-alta sulle zone montane e pedemontane a iniziare da quelle occidentali, bassa sulla pianura, specie centro-occidentale. Temperature in ulteriore lieve aumento, salvo stazionarietà dei valori massimi in montagna.

Venerdì: Cielo tempo da instabile a temporaneamente perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso sulle zone montane, nuvoloso o molto nuvoloso in pianura. Precipitazioni in prevalenza probabilità alta di precipitazioni, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare a partire dalle ore centrali su pianura e pedemontana, già dal mattino sulle zone montane. Temperature in sensibile calo, specie dal pomeriggio sera, con minime raggiunte in serata.

Fenomeni particolari: venerdì 31 sensibile calo delle temperature e precipitazioni diffuse, anche consistenti, con rovesci e temporali.

Radicchio

La fase fenologica è di formazione del grumolo per i tipi precoci mentre per i medi-tardivi va da 7-8 foglie ad inizio formazione del grumolo. L'emergenza è quasi ovunque regolare e lo sviluppo vegetativo in generale è buono, in funzione comunque della quantità di acqua distribuita con l'irrigazione, data la prolungata siccità di quest'anno.

Dal punto di vista fitosanitario si segnala la presenza delle prime larve sia di **Nottua** che di **Piralide**. Tenendo conto anche delle elevate catture sulle trappole, si consiglia di **iniziare la**

difesa. In particolare se si impiega il *Bacillus thuringiensis*, è opportuno nei casi in cui vi sia già la presenza di giovani larve, di intervenire prima con un prodotto abbattente e, successivamente, a distanza di circa 5 giorni, impiegare il Bacillus. Negli altri casi, invece, intervenire direttamente con il Bacillus. In alternativa alla linea di difesa con il Bacillus, possono essere ora impiegati prodotti a base di Emamectina (Affirm) o di Clorantraniliprole (Altacor).

Prossimo bollettino mercoledì 5 settembre