



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 13 DEL 20 GIUGNO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: L'alta pressione di origine africana che ha interessato il Mediterraneo da parecchi giorni tende a lasciare il posto a correnti occidentali in quota, più fresche, a partire dalla giornata di sabato. In pianura tempo in prevalenza stabile almeno fino a venerdì, con temperature molto elevate; maggiore variabilità da sabato con valori termici in contenuta diminuzione. Sulle zone montane, tempo un po' più variabile con locali precipitazioni nel pomeriggio/sera.

Fenomeni particolari: temperature elevate, con valori ben superiori alla media del periodo in particolare nelle massime che potranno raggiungere i 36-38°C sulle zone interne della pianura.

Tempo Previsto: sulle zone centro-meridionali in prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle altre zone, tempo soleggiato ma con tendenza a sviluppo di attività cumuliforme, più intensa sulle zone montane e in particolare sulle Dolomiti. Possibili locali rovesci e temporali sulle Prealpi e zone pedemontane, più probabili sulle Dolomiti. Non si esclude la possibilità di qualche locale fenomeno intenso. Temperature massime molto elevate. Venti sostenuti, a tratti forti da Sud-Ovest in quota.

Giovedì: Cielo in pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane e pedemontane inizialmente soleggiato, dal pomeriggio moderata nuvolosità cumuliforme, specie sui settori più settentrionali. Precipitazioni: nel pomeriggio/sera probabilità di locali rovesci e temporali, medio-bassa sulle Dolomiti, bassa sulle Prealpi. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura, in lieve aumento in montagna.

Venerdì: Cielo tempo prevalentemente soleggiato in pianura, salvo maggiori annuvolamenti sui settori nord-orientali; sulle zone montane e pedemontane tempo inizialmente soleggiato con sviluppo di attività cumuliforme dalle ore centrali; maggiori addensamenti sulle Dolomiti. Precipitazioni dal pomeriggio probabilità medio-bassa di rovesci o temporali sulle zone montane, con possibile parziale estensione alla pianura settentrionale. Non si esclude la possibilità di qualche fenomeno intenso. Temperature stazionarie o in lieve calo, specie in montagna.

Sabato: variabilità con schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti anche intensi. Probabili rovesci o temporali. Temperature in generale diminuzione nei valori massimi.

Patata

La fase fenologica è quasi ovunque di inizio senescenza più o meno avanzata in funzione della precocità delle colture e dell'epoca di semina. **Dal punto di vista fitosanitario** non si segnalano infezioni peronosporiche se non che su dei testimoni non trattati. Per quanto riguarda gli insetti, sulle trappole si osserva un aumento dei voli di **Tignola**. **Per le varietà precoci**, per le quali si prevede la raccolta entro 15 giorni, si consiglia di intervenire con **prodotti di copertura a base di rame** (verificare i tempi di carenza dei prodotti impiegati) **abbinati ad un insetticida per il controllo della Tignola e delle eventuali Nottue** (p.a. Deltametrina attivo sia per Tignola che per Nottue). **Per le varietà tardive**, per il trattamento insetticida si daranno le indicazioni nei prossimi bollettini, mentre per la **Peronospora** intervenire anche in questo caso con **prodotti a base di rame**. Proseguire con le **irrigazioni** con volumi di adacquamento ridotti. Infine per chi opta per il **disseccamento della**

parte aerea di pre-raccolta, intervenire con prodotti a base di Carfentrazone a circa 10 giorni dalla raccolta.

Cipolla a semina primaverile

Lo stadio fenologico è di ingrossamento bulbo. Le alte temperature di questi giorni hanno in generale determinato una situazione di stress fisiologico sulle colture. **Dal punto di vista fitosanitario** si riscontrano un po' ovunque infezioni causate da **Botrite**, con disseccamenti su alcune varietà anche pronunciati. Per quanto riguarda la difesa antiperonosporica, nelle **varietà precoci** proseguire i trattamenti con prodotti a base di **rame**, **sulle tardive con prodotti endoterapici**. In ogni caso aggiungere all'antiperonosporico, **un antibotritico** a base di Ciprodinil + Fludioxinil o Pyrimethanil (per linee di difesa integrata regionali, massimo 2 interventi all'anno contro Botrite). Continuano le infestazioni di **Tripidi** in maniera consistente.

Prossimo bollettino mercoledì 27 giugno