



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 15 DEL 4 LUGLIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Persiste fino a venerdì sulla regione l'influenza di una circolazione debolmente ciclonica che porta tempo variabile, a tratti instabile specie su zone montane e pedemontane. Tempo relativamente più stabile a fine periodo

Tempo Previsto: poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità cumuliforme specie in prossimità dei rilievi. Probabilità medio-bassa sulle zone montane e pedemontane, bassa altrove di qualche locale rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni localmente intensi dal tardo pomeriggio/sera.

Giovedì: Cielo tempo variabile con alternanza di schiarite più ampie in pianura e addensamenti più consistenti in montagna. Precipitazioni probabilità medio-bassa sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura orientale di rovesci o temporali sparsi; probabilità bassa di qualche isolato fenomeno sul resto della pianura. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo leggero aumento in entrambi i valori in pianura.

Venerdì: Cielo tempo variabile, a tratti instabile fino al pomeriggio. Dalla serata possibilità di ampie schiarite. Precipitazioni probabilità medio-alta di rovesci o temporali sparsi con attenuazione dei fenomeni in serata. Possibili fenomeni localmente intensi. Temperature in diminuzione, specie in pianura.

Sabato: Tempo più stabile dei giorni precedenti ed in prevalenza soleggiato, salvo attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

Patata

Lo stadio fenologico della coltura va **da senescenza a raccolta**. Dalle prime osservazioni sulla raccolta, si può dire che la pezzatura dei tuberi è buona, come pure la produzione e la sanità. Relativamente alle operazioni colturali, in alcuni appezzamenti è stato effettuato il disseccamento della parte aerea di pre-raccolta.

Dal punto di vista fitosanitario, visto l'andamento dei voli di **Tignola** tramite le trappole a feromoni, si consiglia vivamente di effettuare un **trattamento insetticida rispettando i tempi di carenza**. Per le colture disseccate e prossime alla raccolta, si raccomanda invece di **velocizzare le operazione stesse di raccolta, portando via nel più breve tempo possibile i cassoni dal campo**, per ridurre la deposizione delle uova sui tuberi.

casi in cui i **bulbi risultano essere ancora di dimensione piccola, si raccomanda di proseguire con le irrigazioni con turni ravvicinati**. Su questa coltura, come già indicato la scorsa settimana, **l'apparato fogliare è quest'anno ridotto**, a causa degli attacchi di **Botrite**, di **Tripidi** ma anche dell'**eccessiva insolazione** e della **alte temperature** di quest'ultimo periodo.

Radicchio

Riprende con questa settimana il servizio di difesa integrata sul Radicchio ed il relativo bollettino.

E' in corso la **preparazione dei terreni**, dopo frumento e cipolla a semina autunnale, di questa coltura. La **concimazione di base** prevede circa 30-50 Kg/ha di azoto secondo la fertilità del terreno ed 80 di fosforo e potassio.

Cipolla a semina primaverile

La fase fenologica è di ingrossamento bulbo e ed in alcuni appezzamenti è prossima la raccolta. Nei

Prossimo bollettino mercoledì 11 luglio