



## ORTICOLE

### BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 17 DEL 18 LUGLIO 2012

#### **METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** Fino a giovedì condizioni di alta pressione per la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre con un moderato flusso occidentale in quota; da venerdì il campo di alta pressione comincerà a cedere a partire dalle zone alpine per il sopraggiungere di un sistema frontale da nord-ovest atteso per sabato. In Veneto le giornate saranno inizialmente soleggiate con temperature in aumento, da venerdì pomeriggio variabilità/instabilità e nubi in aumento con probabili precipitazioni ad iniziare dalle zone montane e pedemontane; probabile fase maggiormente perturbata tra venerdì pomeriggio/sera e sabato con temperature in calo e rinforzi di Bora.

**Tempo Previsto:** cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con modesti e locali annuvolamenti maggiormente probabili in prossimità dei rilievi. Temperature massime in leggero aumento rispetto a ieri su valori lievemente superiori alla media. Venti a prevalente regime di brezza con moderati rinforzi da Sud-Est sulla costa e sulla pianura meridionale.

**Giovedì:** Cielo tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio modesta variabilità sulle zone montane con annuvolamenti irregolari, specie sui settori dolomitici. Precipitazioni generalmente assenti, dal pomeriggio probabilità in moderato aumento sulle zone montane fino a bassa per qualche piovasco o breve rovescio/temporale, un pò più probabile sulle Dolomiti. Temperature minime in contenuto aumento in montagna e moderate variazioni di carattere locale in pianura; massime in contenuto aumento fino a valori in genere moderatamente superiori alla media, in maniera più marcata sulla pianura meridionale.

**Venerdì:** Cielo tempo inizialmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, poi variabile/instabile in montagna e verso sera anche sulla pianura centro-settentrionale, con crescenti annuvolamenti irregolari. Precipitazioni inizialmente assenti, probabilità in aumento nel corso della giornata a partire dalle zone montane e pedemontane di rovesci/temporali sparsi; fenomeni in possibile estensione alla pianura verso sera. Non si escludono temporali localmente intensi. Temperature minime in contenuto aumento, massime in calo sulle zone montane e stazionarie o in lieve aumento in pianura.

**Sabato:** tempo in prevalenza instabile, anche perturbato in montagna, con cielo generalmente molto nuvoloso sulle zone montane e irregolarmente nuvoloso in pianura. Probabili rovesci e temporali sparsi, anche diffusi sulle zone montane/pedemontane, in possibile diradamento dalla serata. Temperature massime in calo anche sensibile, minime pressochè stabili o in contenuto calo. Venti moderati dai quadranti orientali con rinforzi di Bora lungo la costa.

#### **Patata**

**Prosegue la raccolta con produzione più che buone** ed anche dal punto di vista commerciale il prodotto si presenta ben formato e di buona pezzatura. Ancora particolare attenzione **dal punto di vista fitosanitario** va nei confronti della **Tignola, quest'anno particolarmente insidiosa**. Infatti in alcuni appezzamenti il danno ha compromesso seriamente la commercializzazione del raccolto (in questi casi maggiore attenzione dovrà essere fatta il prossimo anno nella difesa). Si ricorda ancora una volta di porre in atto tutti gli **accorgimenti necessari** (breve permanenza dei tuberi in campo, copertura dei cassoni con teli) **atti a ridurre la deposizione delle uova sui tuberi**. Anche in magazzino chiudere con reti anti-insetto le aperture dei locali.

#### **Cipolla a semina primaverile**

**Prosegue la raccolta con produzioni** che variano da appezzamento ad appezzamento, ma **generalmente di modesta entità**, per i motivi più volte ricordati nei precedenti bollettini. Le varietà

tardive non ancora raccolte hanno l'apparato fogliare non più attivo.

#### **Radicchio**

Lo stadio va da preparazione dei terreni ad inizio emergenza per i tipi precoci. Per quanto riguarda le operazioni di presemina, si ricorda il diserbo con prodotti a base di Benfluralin o Propizamide. Sulle colture precoci con piantine appena emerse, si riscontra già la presenza di Ragno rosso (4-6 individui per foglia). La presenza del Ragno sui seminati di radicchio, è correlata ai forti attacchi sulle colture limitrofe di mais. In presenza di Ragno (4 individui per foglia), si raccomanda di intervenire con prodotti specifici. Possono essere impiegate sostanze a base di un fungo antagonista, Beauveria bassiana, efficace su uova e stadi giovanili, oppure altre non ammesse su Ragno dalle linee regionali della difesa integrata, ma registrate sulla coltura, quali quelle a base di Abamectina (es. Vertimec EC) o di Acrinatrina (es. Rufast E-Flo). Questi ultimi due prodotti sono efficaci anche nei confronti del Tripide.

#### **Prossimo bollettino mercoledì 25 luglio**