



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 19 DEL 1° AGOSTO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: L'Italia continua ad essere interessata da un campo di alta pressione di origine africana seppur marginalmente influenzato da una vasto nucleo depressionario centrato sull'Inghilterra. Fino a domenica ci saranno condizioni di prevalente stabilità con temperature in aumento con valori anche ben superiori alla media specie sui settori meridionali della pianura. Sulle zone montane probabile instabilità pomeridiana con attività convettiva.

Tempo Previsto: sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi associata a possibili brevi e locali precipitazioni.

Giovedì: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo probabili nubi basse mattutine nelle valli e sviluppo di attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni assenti in pianura; in montagna probabilità medio-bassa di rovesci ed occasionali temporali, specie dalle ore centrali e sulle Dolomiti. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento con valori anche ben superiori ai settori meridionali della pianura.

Venerdì: Cielo in pianura ben soleggiato; sulle zone montane modesta variabilità con annuvolamenti specie sui settori dolomiti, alternati a schiarite. Precipitazioni probabilità medio-bassa di rovesci e temporali locali sui settori montani, specie quelli dolomiti. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo, salvo lieve calo dei valori massimi sui settori montani.

Sabato: ben soleggiato in pianura; in prossimità dei rilievi variabilità con annuvolamenti alternati a schiarite e probabili rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali. Temperature senza variazioni di rilievo salvo diminuzione dei valori massimi in montagna.

Radicchio

Il radicchio di tipo precoce è allo stadio di emergenza più o meno completata. Le tipologie medio tardive sono in fase di semina appena avvenuta o che si effettuerà nei prossimi giorni. **Sotto il profilo fitosanitario** nelle colture emerse non si riscontrano significative presenze di ragnetto rosso, contenute anche dalle irrigazioni effettuate sulle colture. In caso di elevate presenze di ragnetto rosso riscontrate in qualche coltura, **si**

raccomanda di intervenire con prodotti a base di un fungo antagonista, *Beauveria bassiana*, efficace su stadi giovanili, oppure a base di Abamectina (es. Vertimec EC) efficace anche nei confronti del **Tripide**.

Per l'assenza di precipitazioni è necessario eseguire turni irrigui ravvicinati sia per le colture appena seminate che per quelle in fase di emergenza.

Prossimo bollettino mercoledì 08 agosto