



## ORTICOLE

### BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 4 DEL 18 APRILE 2012

#### **METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** Un nucleo depressionario che staziona sull'Europa centro-settentrionale convoglia una serie di impulsi umidi sud-occidentali. Il tempo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da spiccata variabilità con alternanza di nuvolosità a tratti intensa, accompagnata da precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, e temporanee schiarite.

**Tempo previsto:** Inizialmente cielo in prevalenza nuvoloso in prossimità dei rilievi e poco nuvoloso in pianura. In seguito aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso. Precipitazioni locali in pianura, da sparse a diffuse in prossimità dei rilievi. Probabili rovesci e temporali. Limite della neve in abbassamento fino a 1000/1200 metri in serata. Temperature massime senza variazioni di rilievo in pianura, in calo in montagna.

**Giovedì:** In pianura al mattino schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti; in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità. Sulle zone montane tempo instabile con annuvolamenti a tratti consistenti. Precipitazioni sulle zone montane e pedemontane probabilità medio-alta (60/80%) di precipitazioni sparse al mattino con tendenza ad aumento della probabilità fino ad alta (80/100%) nel pomeriggio. In pianura al mattino in prevalenza assenti, in seguito probabilità medio-alta (60/80%) di precipitazioni sparse. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno ai 1100/1300 metri al primo mattino e alla sera, nelle ore centrali intorno ai 1300/1500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo.

**Venerdì:** In pianura instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti; in montagna tempo generalmente perturbato. Precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con frequenti rovesci o temporali. Limite della neve intorno a 1100/1300 metri al mattino e verso sera, sui 1500/1600 metri nelle ore centrali. Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in lieve diminuzione in pianura.

**Sabato:** Tempo variabile con annuvolamenti diffusi; tendenza a maggiori schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni sparse specie sulle zone montane e pedemontane in attenuazione verso sera. Possibili rovesci o temporali. Temperature in aumento nei valori massimi, senza variazioni di rilievo in quelli minimi.

#### **Patata**

**Lo stadio fenologico** va da emergenza più o meno avanzata fino a completata, in questi ultimi casi con rosetta ben formata. Le **basse temperature del 9 aprile** non hanno provocato danni alle colture; gli effetti si evidenziano infatti sulle foglie, ma non sui germogli. Per quanto riguarda il diserbo di pre-emergenza, è ancora presto per valutare la sua efficacia sulle infestanti.

#### **Cipolla a semina primaverile**

**La fase fenologica** è di 2° foglia vera ben formata. Per quanto riguarda lo **sviluppo vegetativo**, alcune colture sono stentate, pertanto in queste situazioni può essere d'aiuto una leggera concimazione azotata. Per il **controllo delle infestanti**, proseguire con le **microdosi** con prodotti a base di Ioxinil, a distanza di circa una settimana dall'ultimo intervento, alla dose di 0,12 l/ha di prodotto commerciale.

#### **Cipolla a semina autunnale**

**Lo stadio** per le varietà precoci è di inizio bulbificazione e lo sviluppo vegetativo è buono. Per quanto riguarda la **difesa fitosanitaria**, viste anche le previsioni di pioggia, si consiglia di proseguire con il **2° trattamento antiperonosporico** con prodotti a base di Azoxystrobin (Ortiva) o a base di Pyraclostrobin + Dimetomorf (Cabrio Duo), quest'ultima miscela da preferire sulle colture più lussureggianti (per le linee di difesa integrata massimo 2 interventi all'anno con Azoxystrobin e Pyraclostrobin e 3 per Dimetomorf). Si consiglia di monitorare in campo l'eventuale presenza dei primi sintomi di **Botrite** (tacche biancastre sulla vegetazione) e nel caso aggiungere all'antiperonosporico un antibotritico (per le linee di difesa integrata massimo 2 interventi all'anno) a base di Ciprodinil + Fludioxinil (Switch) o Pyrimethanil (Scala).

**Prossimo bollettino giovedì 26 aprile**