



## **ORTICOLE**

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 6 DEL 3 MAGGIO 2012**

#### **METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** Una graduale moderata intensificazione del flusso umido da sud-ovest in quota favorisce un progressivo incremento della variabilità a partire dalle zone montane. Tenderà ad aumentare anche la probabilità di precipitazioni dapprima in montagna e poi anche in pianura, specie a fine periodo.

**Tempo previsto:** Tempo perlopiù soleggiato, ma con degli annuvolamenti che dapprima saranno di carattere locale e poi si presenteranno sparsi soprattutto in montagna. Possibilità di qualche locale piovasco o breve rovescio sulle zone montane e pedemontane.

**Venerdì:** In pianura da poco a parzialmente nuvoloso, in montagna tempo variabile con spazi di sereno anche ampi fino al mattino e più annuvolamenti sparsi in seguito. Precipitazioni qualche piovasco o breve rovescio nelle ore più calde con probabilità al più media (40/60%) sulle zone montane centro-orientali e sulla pedemontana trevigiana, medio-bassa (20/40%) sulle altre zone pedemontane, bassa (0/20%) altrove. Temperature contenute variazioni di carattere locale.

**Sabato:** Condizioni di variabilità, con schiarite più significative in pianura, maggiori addensamenti nuvolosi sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni probabili fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento in quota e senza notevoli variazioni altrove; massime in moderato calo.

**Domenica:** Tempo variabile, a tratti instabile, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi. Precipitazioni sparse, con rovesci e temporali. Variazioni perlopiù contenute e di carattere locale nei valori termici.

#### **Patata**

**La fase fenologico** è di tuberizzazione ed a livello aereo lo stadio varia dal 30 al 40% di copertura della fila nelle semine tradizionali, mentre per quelle a 90 cm la copertura è intorno al 25%.

Il controllo delle infestanti è buono e pertanto non si consiglia alcun intervento.

**Dal punto di vista fitosanitario** si segnala il ritrovamento dei primi adulti di **Dorifora**; contro questo insetto, per chi segue la strategia di difesa con prodotti a base di Imidacloprid, può ancora intervenire, mentre qualsiasi altro trattamento insetticida è prematuro. Per quanto riguarda la **Peronospora**, **non si consiglia per questa settimana alcun trattamento**. In mancanza di precipitazioni, intervenire con **l'irrigazione** dato lo stadio fenologico.

#### **Cipolla a semina primaverile**

**Lo stadio è di 3° foglia** e lo sviluppo vegetativo varia da appezzamento ad appezzamento. Relativamente al controllo delle infestanti, per ora

sembra buono, pertanto non si consiglia di intervenire per il momento; nei casi invece in cui ci fossero nascite di infestanti tardive, intervenire con le microdosi con prodotti a base di Oxifluorfen alla dose di 0,05 l/ha di f.c..

#### **Cipolla a semina autunnale**

Lo stadio è di ingrossamento bulbo ed in alcuni casi su varietà precoci è di maturazione. Dal punto di vista fitosanitario non si segnalano infezioni fungine, ma si consiglia di proseguire con i trattamenti antiperonosporici con prodotti a base di Dimetomorf + Pyraclostrobin (Cabrio Duo) o di Iprovalicarb + Ossicloruro (Melody Compact) o Metalaxil-M + Rame (Vari) o Benalaxil + Rame (Vari). Sulle varietà precoci con vegetazione ricadente che saranno raccolte tra una decina di giorni, si può ritenere conclusa la difesa; in ogni caso verificare il periodo di carenza dei prodotti impiegati in funzione dell'epoca di raccolta.

**Prossimo bollettino mercoledì 9 maggio**