



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.7 DEL 04 MAGGIO 2011

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: L'instaurarsi di un promontorio anticiclonico proveniente da ovest determinerà sulla nostra regione tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato con temperature massime in graduale aumento.

Tempo previsto: Su Dolomiti cielo sereno, altrove moderata variabilità con annuvolamenti, specie in prossimità delle Prealpi e sulla pianura meridionale, alternati ad ampie schiarite. Non si esclude qualche breve e locale precipitazione sulle Prealpi e sulla pianura meridionale e, con minor probabilità, sulle zone pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Clima fresco in serata. Venti da Est in attenuazione.

Giovedì: Stato del cielo in prevalenza sereno, salvo modesti annuvolamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi, specie sulle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo o in contenuta ripresa, specie in montagna.

Venerdì: Stato del cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve diminuzione in pianura, in lieve aumento in quota; massime in aumento.

Osservazioni: marcata escursione termica diurna con clima fresco di notte ed al primo mattino e mite nel corso della giornata.

Sabato: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno salvo sviluppo di modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature in ulteriore contenuto aumento.

Nel corso della nottata tra martedì e mercoledì si sono verificati dei temporali che hanno apportato una ventina di mm di acqua ad Asigliano e 37 circa a Noventa.

Patata

Prosegue la fase di tuberizzazione per le colture più avanzate e, per le stesse, lo stadio dell'apparato vegetativo va da un 40 ad un 50% di copertura della fila. Sulle colture più tardive e di risemina, la fase è di emergenza completata con rosetta ben formata. Dal punto di vista fitosanitario non si segnalano problemi causati da funghi e, relativamente agli insetti, la **Dorifora** è in fase di ovideposizione e rare sono le larve già nate. Per la **difesa antiperonosporica**, solo sulle colture più avanzate, potrà essere effettuato un trattamento di copertura all'inizio della prossima settimana con prodotti a base di Zoxamide + Mancozeb o a base di Fluazinam. Al fungicida aggiungere un prodotto a base di Thiamethoxam per chi sceglie questa strategia di difesa per la **Dorifora**.

Cipolla a semina primaverile

La fase fenologica va da 4 a 5 foglie con buone condizioni vegetative. In alcuni appezzamenti il

controllo delle infestanti non è stato quest'anno particolarmente soddisfacente a causa dell'andamento meteo. Nei casi di necessità, intervenire ancora con prodotti a base di Oxifluorfen. Dal punto di vista fitosanitario si segnala in alcuni appezzamenti la presenza del **Tripide**, intervenire in questi casi tempestivamente con un insetticida specifico (max 3 interventi /anno secondo le linee di difesa integrata)

Cipolla a semina autunnale

Prosegue lo stadio di ingrossamento bulbo ed in alcuni appezzamenti di varietà precoci si sta avvicinando la fase di maturazione-raccolta. Relativamente alla **difesa antiperonosporica**, si consiglia di proseguire negli appezzamenti non prossimi alla raccolta, con il 5° trattamento con prodotti sistemici a base di Iprovalicarb + Ossicloruro (per la difesa integrata max 3 interventi all'anno con Iprovalicarb e Dimetomorf), Metalaxil-M o Benalaxil, facendo attenzione al periodo di carenza del formulato commerciale impiegato.

Prossimo bollettino mercoledì 11 maggio