



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**



**BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 7 DEL 9 MAGGIO 2012**

**METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** L'espansione di un promontorio anticiclonico dall'Africa nord-occidentale favorisce qualche giorno di tempo stabile e perlopiù soleggiato, con temperature che si porteranno su valori anche ben superiori alla norma. A fine periodo, una massa d'aria fredda si avvicinerà dal Nord Europa portando una fase d'instabilità, con rovesci sparsi e probabili temporali.

**Tempo previsto:** Tempo parzialmente soleggiato, con ampi spazi di sereno alternati a qualche velatura in transito e a degli annuvolamenti cumuliformi in montagna specie verso nord. Sulle zone montane e in particolare sulle Dolomiti sarà probabile qualche locale precipitazione, di modesta entità salvo occasionali brevi rovesci.

**Giovedì:** Sereno o poco nuvoloso, salvo modesti locali addensamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature contenute variazioni di carattere locale nei valori minimi, moderato aumento di quelli massimi.

**Venerdì:** sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni pressochè assenti. Temperature in moderato aumento. Osservazioni valori termici ben superiori alla norma.

**Sabato:** Sulle zone pianeggianti tempo dapprima soleggiato e poi variabile, con instabilità e nuvolosità più estesa a fine giornata; su quelle montane, tempo da variabile a instabile con spazi di sereno soprattutto all'inizio sulle Prealpi e nubi più diffuse in seguito. Crescente probabilità di precipitazioni dapprima in montagna e infine anche in pianura, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in moderato aumento, massime in calo in montagna e pressochè stazionarie altrove.

**Patata**

**Lo stadio** varia da 20-30% ad 80-90% di copertura della fila in funzione degli appezzamenti. Dato la stadio fenologico, è indispensabile **proseguire con i turni irrigui** in mancanza di precipitazioni utili. **Dal punto di vista fitosanitario, esclusivamente sulle colture più sviluppate**, si consiglia di intervenire a titolo preventivo entro la corrente settimana con il **primo trattamento antiperonosporico di copertura** con prodotti a base di Fluazinam o Zoxamide. In questi casi aggiungere un prodotto a base di Thiametoxan per chi sceglie questa strategia di difesa contro la **Dorifora**.

**Cipolla a semina primaverile**

**La fase fenologica** è di 4 - 5 foglie e lo sviluppo vegetativo varia da appezzamento ad appezzamento. Relativamente al **controllo delle infestanti**, in caso di presenza intervenire con le microdosi con prodotti a base di Oxifluorfen alla dose di 0,05 l/ha di f.c.. Per quanto riguarda gli

aspetti fitosanitari, si segnalano i primi **Tripidi**; contro questo insetto intervenire tempestivamente in caso di presenza accertata con un insetticida specifico ed un buon bagnante.

**Cipolla a semina autunnale**

**Lo stadio** va da ingrossamento bulbo a maturazione – senescenza. Non si segnalano su questa coltura infezioni peronosporiche, tuttavia **sulle varietà tardive** si consiglia di **proseguire con i trattamenti antiperonosporici** con prodotti a base di Dimetomorf + Pyraclostrobin (Cabrio Duo) o di Iprovalicarb + Ossicloruro (Melody Compact) o Metalaxil-M + Rame (Vari) o Benalaxil + Rame (Vari). **Sulle varietà precoci**, non ancora prossime alla raccolta, il trattamento potrà essere effettuato **con prodotti a base di rame**, verificando il periodo di carenza dei prodotti impiegati in funzione dell'epoca di raccolta. **Sulle precoci ormai vicine alla raccolta**, i trattamenti si ritengono conclusi.

**Prossimo bollettino mercoledì 16 maggio**