



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 8 DEL 16 MAGGIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Dopo il passaggio mercoledì di una rapida perturbazione seguirà la rimonta di una vasto campo anticlonico sul Mediterraneo; domenica avvicinamento di una perturbazione da Ovest. Da giovedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato con progressivo aumento delle temperature; domenica variabilità con possibilità di qualche precipitazione. **Fenomeni particolari:** Giovedì valori termici sotto la media del periodo, specie nei valori minimi con gelate sulle zone montane non interessate da Foehn.

Tempo previsto: Inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo residua nuvolosità sui settori orientali in attenuazione; in seguito ampi tratti di sereno con locali addensamenti nuvolosi, specie sui settori prealpini. Nelle prime ore del pomeriggio residue precipitazioni sulla costa e settori orientali della pianura, in seguito possibili locali precipitazioni su Prealpi e zone pedemontane. Fenomeni in esaurimento a fine giornata. Clima fresco con temperature massime in calo e sotto la media del periodo. In pianura nelle prime ore del pomeriggio venti sostenuti da Nord-Est su costa ed entroterra limitrofo; in seguito attenuazione della ventilazione che diverrà debole e dai quadranti meridionali. Sulle zone montane venti sostenuti da Nord con episodi di Foehn nelle valli e localmente sulla pedemontana.

Giovedì: Sereno o poco nuvoloso, per passaggio di nubi alte dalla serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione salvo risultare in aumento in quota; massime in aumento.

Venerdì: Parzialmente nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti salvo probabilità bassa (5-25%) di fenomeni locali sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento; massime senza variazioni di rilievo, in aumento in quota.

Sabato: Sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio probabili locali addensamenti nuvolosi con possibili locali precipitazioni specie sui settori occidentali.

Patata

Lo stadio delle varietà precoci è di inizio fioritura, mentre la copertura della fila arriva in alcuni casi anche al 100%; a livello sotterraneo prosegue invece l'ingrossamento dei tuberi. **Dal punto di vista fitosanitario** non si segnala Peronospora, mentre in alcuni appezzamenti in cui non è stato effettuato il trattamento insetticida, si ritrovano larve di Dorifora. **Si consiglia a titolo preventivo di estendere a tutte le colture** entro la corrente settimana e comunque prima delle precipitazioni previste per il fine settimana, **la difesa antiperonosporica** con prodotti a base di Fluazinam o Zoxamide. Per le colture più sviluppate questo trattamento sarà il secondo consigliato. Per coloro che non avessero ancora effettuato l'insetticida per il controllo della **Dorifora**, in presenza di infestazione di larve, aggiungere all'antiperonosporico un insetticida specifico.

Cipolla a semina primaverile

Lo stadio è mediamente di 5 foglie e lo sviluppo vegetativo varia da appezzamento ad appezzamento. Per quanto riguarda il **controllo delle infestanti**, in caso di nascite di **graminacee**, intervenire con un

graminocida specifico. Relativamente alla **difesa antiperonosporica**, **si consiglia di intervenire con il 1° trattamento di tipo cautelativo** prima dell'eventuale pioggia con prodotti a base di Azoxystrobin (Ortiva). Purtroppo su questa coltura si segnala una persistente presenza di **Tripidi**; in questi casi aggiungere all'antiperonosporico un insetticida specifico, sempre accompagnato da un buon bagnante. Si ricorda che per le linee di difesa integrata regionale, sono ammessi al massimo 3 interventi all'anno contro questo insetto.

Cipolla a semina autunnale

Per le varietà precoci è ormai prossima la **raccolta**, mentre per le **tardive la fase è di accrescimento del bulbo**. Data la presenza in zona di **focolai di Peronospora**, **nelle varietà tardive si consiglia di proseguire con la difesa** in funzione dell'epoca di raccolta. In particolare per le più tardive impiegare prodotti di tipo translaminare o sistemico, mentre per le medio-tardive prodotti a base di rame. In ogni caso verificare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

Prossimo bollettino mercoledì 23 maggio