



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 9 DEL 23 MAGGIO 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Correnti orientali debolmente cicloniche interessano la regione fino a giovedì. In seguito giunge dall'Europa Nord-orientale un nucleo di aria fredda in quota che interesserà il Veneto tra venerdì e sabato. Sul Veneto sono attese iniziali condizioni di variabilità accompagnate da un temporaneo rialzo delle temperature giovedì, da venerdì probabile aumento dell'instabilità con delle precipitazioni sparse e temperature in calo, domenica probabile miglioramento.

Tempo previsto: In pianura generalmente poco nuvoloso salvo residua nuvolosità sui settori meridionali e costieri, in attenuazione; sulle zone montane inizialmente soleggiato ma con nuvolosità irregolare in aumento per moderata attività cumuliforme, in attenuazione dalla serata. Nelle ore pomeridiane probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle Prealpi e medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, altrove possibili locali fenomeni, specie lungo la pedemontana.

Giovedì: Al mattino da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle Dolomiti in parziale estensione alle Prealpi/pedemontana e verso sera anche alla pianura. Precipitazioni generalmente assenti al mattino, dal pomeriggio probabilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in aumento fino a medio-alta (50-75%) dapprima su Dolomiti e poi su Prealpi/pedemontana, in possibile parziale estensione ad alcune zone della pianura settentrionale dalla sera (probabilità bassa 5-25%). Temperature in montagna senza variazioni di rilievo o in lieve aumento sulle zone prealpine; in aumento in pianura, con temperature anche leggermente superiori alla media del periodo, specie le massime.

Venerdì: tempo variabile a tratti instabile con nuvolosità alternata a schiarite. Precipitazioni fino al mattino possibili residui fenomeni tra Prealpi e pianura occidentali, nel corso della giornata probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane e medio-bassa (25-50%) altrove per precipitazioni sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature in calo in montagna. In pianura minime senza variazioni di rilievo, massime in diminuzione, anche sensibile.

Sabato: tempo variabile/instabile con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori centro-settentrionali. Temperature in leggero calo.

Patata

Lo stadio è di ingrossamento tubero e la chiusura della fila è ormai completata quasi ovunque. **Dal punto di vista fitosanitario**, viste le condizioni meteo di questi ultimi giorni (Noventa 36 mm, Lonigo 46,4) e lo sviluppo vegetativo raggiunto dalle colture, si raccomanda di **effettuare il 2°** (in alcuni casi 3°) **trattamento antiperonosporico**, preferibilmente con prodotti di tipo endoterapico. Relativamente agli insetti, il controllo della **Dorifora** è per ora più che soddisfacente in quasi tutti i seminati, mentre per la **Tignola** si rileva la presenza di adulti sulle trappole a feromoni, ma non si consiglia alcun trattamento.

Cipolla a semina primaverile

Lo stadio è di 5-6 foglie con sviluppo più o meno accentuato in funzione degli appezzanti. **Dal punto di vista fitosanitario** si sono ritrovate le **prime infezioni di Peronospora**, comunque

limitate. **Si raccomanda di effettuare il 2° trattamento antiperonosporico**, appena possibile, con prodotti a base di Pyraclostrobin + Dimetomorf o Iprovalicarb + Ossicloruro o Metalaxil-M o Benalaxil. In caso di presenza dei primi sintomi di **Botrite**, aggiungere all'antiperonosporico un antibotritico a base di Ciprodinil + Fludioxinil o Pyrimethanil. Si segnala ancora presenza di **Tripide**, nonostante le precipitazioni dei giorni scorsi.

Cipolla a semina autunnale

La fase è di senescenza-raccolta ed il prodotto è qualitativamente buono. Per questa coltura **si ritengono conclusi i trattamenti ad eccezione delle varietà più tardive**, la cui raccolta avverrà indicativamente nella prima decade di giugno. In questi casi può essere utile un intervento con prodotti rameici, facendo attenzione al periodo di carenza del formulato commerciale impiegato.

Prossimo bollettino mercoledì 30 maggio