



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



VITE

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.11 DEL 19 GIUGNO 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Sulle zone montane e pedemontane schiarite alternate a nuvolosità cumuliforme, anche consistente, in probabile estensione a parte della pianura centro-settentrionale, con associata probabilità (medio-bassa 25-50%) di qualche piovasco o locale rovescio e temporale. Sulla pianura meridionale in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature massime intorno alla media del periodo.

Venerdì: Cielo: Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sui settori dolomitici. Dalle ore centrali a iniziare da Nord aumento della nuvolosità con schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti più probabili e consistenti in prossimità dei rilievi e su pianura nord-orientale. Precipitazioni: In prevalenza assenti al mattino. Dalle ore centrali aumento della probabilità (fino a medio-alta 50-75%) di qualche locale e breve precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale dapprima su zone montane e pedemontane e successivamente anche sulla pianura settentrionale ed orientale; altrove generalmente assenti. Temperature: In lieve aumento.

Sabato: Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti nelle prime ore; nel corso del pomeriggio sviluppo di modesta attività cumuliforme a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo possibili residue precipitazioni nelle prime ore sulla pianura meridionale e Prealpi. Temperature: Minime in aumento, massime in lieve calo salvo risultare in aumento sulle Dolomiti.

Domenica: Condizioni di prevalente stabilità ma con nuvolosità irregolare, più consistente nel pomeriggio in prossimità dei rilievi prealpini e su zone pedemontane, alternata a schiarite. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.

Andamento meteo: La consistente e minacciosa perturbazione del fine settimana scorso ha interessato solo marginalmente il territorio apportando peraltro, ovunque, delle precipitazioni senza grandine. In Pedemontana come nel Basso vicentino le quantità sono state contenute a 10-15 mm mentre nella fascia centrale della Provincia sono caduti da 22 a 40 mm. Le temperature massime, dai 33°C medi della scorsa settimana, sono scese di 6-8°C mentre le minime di 3-4°C.

Fase e andamento vegetativo: Varietà precoci: chiusura grappolo. Varietà tardive: ingrossamento acini-prechiusura grappolo.

Pratiche colturali: In molte situazioni colturali su terreni fertili le masse vegetative hanno bisogno di un nuovo passaggio di riordino. Nei sistemi a spalliera in particolare si raccomanda di sfoltire il verde nella fascia dei grappoli per favorire il ricircolo dell'aria e la penetrazione dei trattamenti. Fare questa operazione con moderazione!

Stato sanitario: Peronospora: la debole infezione di cui erano già stati rilevati i primi rari sintomi (macchie) la scorsa settimana si è compiuta in quasi tutti i comprensori con la medesima blanda intensità. Nessuna preoccupazione al momento anche grazie alle alte temperature dei giorni scorsi

che ne hanno inibito la capacità riproduttiva. Oidio: nessun sviluppo visibile rispetto alla scorsa settimana. Tignoletta di 2° generazione: con un ritardo di 3-5 giorni rispetto alle zone più calde e di pianura è iniziato il volo degli adulti anche nelle zone meno anticipate di media collina e fondovalle. E iniziata la fase di ovideposizione della 2° generazione della cocciniglia *Planococcus ficus*.

Difesa: Entro questo fine settimana è necessario reintervenire in tutti i comprensori viticoli con un antiperonosporico di copertura a base rameica e uno zolfo ad alto dosaggio.

Esclusivamente nei comprensori del Medio-Basso vicentino, laddove la tignoletta ha causato dei danni apprezzabili alla produzione soprattutto lo scorso anno, è raccomandato aggiungere alla miscela fungicida un insetticida specifico ad azione ovo-larvicida come quelli a base di Tebufenozide, Metossifenozide o Indoxacarb.

Dato che l'insetticida deve proteggere solo i grappoli potrebbe essere realizzato un trattamento separato dai fungicidi nei sistemi a spalliera. In tutti i casi di allevamento comunque preferire le ore serali per la sua esecuzione. Per altre info sugli insetticidi impiegabili vedere lo "speciale Tignoletta" presente nel sito.

Prossimo bollettino giovedì 26 giugno