



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



VITE

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.13 DEL 3 LUGLIO 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Cielo sereno o al più poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature massime in aumento, specie in montagna.

Venerdì: Cielo: Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per delle velature in transito e qualche cumulo a ridosso dei rilievi fino al pomeriggio, in seguito moderato aumento della variabilità con annuvolamenti irregolari a partire dalle zone montane in parziale estensione alla pianura. Precipitazioni: Precipitazioni assenti fino al pomeriggio. Dalla sera probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e bassa (5-25%) sulla pianura per qualche pioggia anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature: Minime in contenuto calo sulle zone pianeggianti, stazionarie o in contenuto aumento su quelle montane. Massime in aumento, un po' più sensibile in montagna.

Sabato: Cielo: Nella notte e fino alle prime ore del mattino residua variabilità poi tempo in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti sparsi in montagna e locali in pianura dal pomeriggio. Precipitazioni: Nelle prime ore possibile qualche residua e locale pioggia, in seguito precipitazioni assenti salvo probabilità in nuovo aumento fino a medio-bassa (25-50%) dal pomeriggio sui settori dolomitici e bassa (5-25%) su zone prealpine per qualche rovescio o locale temporale. Temperature: Temperature minime in moderato aumento; massime in lieve aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in contenuto calo su quelle montane.

Domenica: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo una leggera variabilità per locali addensamenti nuvolosi soprattutto nel pomeriggio/sera in montagna, dove non si esclude qualche locale rovescio o temporale. Temperature in generale lieve aumento.

Andamento meteo: Settimana ancora governata da una certa instabilità atmosferica. I temporali del fine settimana scorso hanno portato 20-30 mm di pioggia sul territorio a Nord di Vicenza e 10-20 nel resto della Provincia. Hanno fatto eccezione il territorio delle vallate dei Lessini che hanno beneficiato di ben 40-50 mm e il settore sud-est del Basso Vicentino che invece è rimasto quasi all'asciutto con 3 mm complessivi. C'è stato un episodio grandinigeno di medio-bassa portata tra Castegnero e Nanto. Temperature inferiori alla media del periodo di 3°C circa sulle massime e di 1°C sulle minime.

Fase e andamento vegetativo: Varietà precoci: pre-invaiatura. Su Pinot grigio primi acini estrusi invaiati. Varietà tardive: chiusura grappolo.

Stato sanitario: Peronospora: sono stati segnalati giusto stamani i primi sintomi delle infezioni partite con le piogge di martedì e mercoledì scorsi. In attesa di verificarne la portata e l'estensione con i sopralluoghi della prossima settimana va detto che, ad oggi, **questo parassita è presente quasi esclusivamente su vigneti con elevata vigoria e massa vegetativa e con importanti cariche produttive** sia su foglia che su grappolo (negron) anche se solo occasionalmente in modo realmente significativo. Nelle zone di pianura e fondo valle l'elevata umidità e soprattutto il prolungato periodo di bagnatura ha determinato le condizioni ideali per

lo sviluppo virulento della Botrite. In particolare nei vigneti grandinati, su tutte le varietà, ma anche su quelli non colpiti né da grandine né da Tignoletta di Pinot bianco e grigio e Chardonnay sono comparsi dei focolai anche importanti ed estesi. Oidio: presenza generalmente limitata in tutti i comprensori e comunque, finora, ben controllata ovunque. Tignoletta di 2°: praticamente nessun volo in questi ultimi giorni e assenza generalizzata di presenze larvali. Fillossera: le infestazioni di questo afide sono assai marcate nell'area dei Berici e su alcuni vitigni in particolare (Tai rosso e Chardonnay) e interessano diffusamente anche le ultimissime foglie.

Difesa: Per le realtà laddove sono presenti dei vistosi attacchi di Botrite sui grappoli è già stato consigliato di intervenire a "tamponamento" con prodotti rameici ad alto dosaggio come le poltiglie bordolesi DOPO aver eseguito un opportuno sfoltimento e/o sfogliatura della zona produttiva. Questo intervento garantirà anche la protezione antiperonosporica.

In tutte le altre situazioni e per tutti i comprensori è necessario programmare una ricopertura con qualsivoglia prodotto rameico alla scadenza del trattamento endoterapico consigliato in precedenza con uno zolfo ad alto dosaggio in affiancamento. **Per le zone ad alto rischio tignoletta: non sono necessari interventi insetticidi al momento.**

Prossimo bollettino giovedì 10 luglio

www.provincia.vicenza.it - Segreteria telefonica 0444 437027