



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## VITE

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.17 DEL 31 LUGLIO 2014

#### METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

**Giovedì:** Nuvolosità irregolare, inizialmente anche estesa, si alternerà a schiarite. Su zone montane e pedemontane probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche rovescio o temporale in possibile sconfinamento sulla pianura centro-settentrionale nel tardo pomeriggio/sera. Temperature massime in aumento, localmente anche significativo.

**Venerdì:** Cielo: In pianura in prevalenza soleggiato al mattino salvo locali annuvolamenti, nel corso del pomeriggio tendenza a maggiore nuvolosità. Sulle zone montane e pedemontane inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, a partire dalle ore centrali nuvolosità in aumento con qualche schiarita. Precipitazioni: Su pianura in prevalenza assenti al mattino, a partire dalle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche locale precipitazione. Su zone montane e pedemontane già dal mattino sarà possibile qualche rovescio/temporale, più probabile e frequente nel pomeriggio (probabilità medio-alta 50-75%). Temperature: Minime in aumento, pressoché stazionarie in quota; massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento.

**Sabato:** Cielo: Variabilità, a tratti instabilità, con schiarite anche ampie, specie al mattino su costa e zone meridionali e annuvolamenti più frequenti a partire dalle ore centrali. Precipitazioni: In pianura al mattino probabilità bassa (5-25%) di fenomeni locali, in seguito aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Su zone montane e pedemontane fin dal mattino saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che nel pomeriggio tenderanno a divenire più probabili (probabilità medio-alta 50-75%); fenomeni da locali a sparsi. Temperature: Senza variazioni di rilievo.

**Domenica:** Tratti di nuvolosità irregolare alternati a schiarite, specie in pianura. Nel corso della giornata saranno probabili delle precipitazioni discontinue, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio/sera probabile miglioramento con schiarite via via più ampie. Temperature senza variazioni di rilievo.

#### **Andamento meteo:** Il maltempo non da tregua!

In questa settimana si sono verificati altri 4-5 eventi che hanno lasciato da 60 a 110 mm di pioggia su tutto il territorio vicentino. In totale, nei 23 giorni intercorsi dall'inizio dell'invasatura delle varietà precoci ad oggi, le precipitazioni hanno superato abbondantemente i 200 mm quasi ovunque con una frequenza di giorni piovosi eccezionale, pari a circa il doppio della norma. Non sono stati registrati eventi grandinigeni in questa circostanza. Le temperature massime sono state inferiori alla norma di ben 5°C mentre le minime di 1-2°C.

**Fase e andamento vegetativo:** Varietà precoci e medie: invasatura avanzata. Varietà tardive: inizio invasatura. L'avanzamento di fase ha subito un brusco rallentamento nell'ultimo periodo e da alcuni giorni sembra essere addirittura in stallo.

**Stato sanitario: Peronospora:** condizioni ancora estremamente favorevoli a questo parassita, ovviamente. Non sono pochi i casi nel medio-basso vicentino dove, purtroppo, le continue reinfezioni hanno interessato le produzioni delle varietà medio-tardive, ivi comprese le Garganeghe. **Botrite: la muffa grigia ha una virulenza strabiliante!** Le continue bagnature, il notevole volume acquisito dagli acini e la fragilità delle bucce hanno determinato cedimenti e fessurazioni che permettono a questo fungo di attaccare facilmente le produzioni delle varietà precoci e a grappolo compatto in modo talvolta

intenso. Su questi casi in particolare si constata pure la presenza di **Marciume acido**. Tignoletta: in leggero anticipo sul previsto sono comparsi, già alla fine della scorsa settimana, gli adulti di 3° generazione. Le catture sono al momento molto disomogenee tra i comprensori e anche tra aree limitrofe. In diversi casi tuttavia le presenze sono già numerose (più di 50 individui a trappola/settimana).

**Difesa: E' necessario insistere con i trattamenti!** Per tutti i comprensori viticoli entro venerdì 1 agosto p.v. bisogna reintervenire nuovamente su tutte le varietà con prodotti rameici ad alto dosaggio per controllare la peronospora e, collateralmente, la botrite. Contro quest'ultima, sulle varietà precoci, è inoltre opportuno fare un trattamento specifico in successione. In previsione di un probabile avvio anticipato delle raccolte delle cv. precoci è necessario impiegare prodotti con periodo di carenza ridotto. Tra i rameici la Poltiglia disperss, il Cuprofix ultra disperss, il King 360 hp e il Selecta disperss hanno 5 gg di carenza. **Negli ambienti dove la Tignoletta di 3° generazione è abitualmente causa di danno impiegare, al contempo o separatamente a seconda delle situazioni, un insetticida specifico.** Sulle cv. precoci preferire quelli a base di Indoxacarb (10 gg di carenza) o Emamectina benzoato (7 gg). Sulle medio-tardive si può anche optare per Metossifenzide (14 gg di carenza) o Tebufenzide (30 gg).

**Prossimo bollettino giovedì 7 agosto**