



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



VITE

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.18 DEL 7 AGOSTO 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Venerdì: Cielo: In pianura in prevalenza soleggiato salvo locali annvolamenti al primo mattino; sulle zone montane e pedemontane nelle prime ore probabile nuvolosità bassa in seguito ampie schiarite si alterneranno a nuvolosità via via più frequente nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: In pianura in prevalenza assenti; sulle zone montane e pedemontane a partire dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci od occasionali temporali.

Sabato: Cielo: In pianura tempo in prevalenza soleggiato al mattino, a partire dalle ore più calde aumento della nuvolosità; in montagna cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con schiarite più probabili al mattino. Precipitazioni: Al mattino precipitazioni assenti in pianura mentre sulle zone montane e pedemontane aumenterà gradualmente la probabilità di qualche rovescio o temporale (probabilità medio-bassa 25-50%). Nel corso del pomeriggio su zone montane e pedemontane ulteriore aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio-alta 50-75%). In pianura a partire dai settori settentrionali e verso sera anche altrove, probabili locali fenomeni (probabilità medio-bassa 25-50%). Temperature: Minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Andamento meteo: Condizioni di spiccata instabilità atmosferica continuano a generare ondate di maltempo su tutto il territorio. "Solo" un paio di eventi piovosi in questi ultimi 7 giorni con 10-20 mm in media e scrosci di 40-60 mm in varie località ma anche grandine. Stavolta sono state colpite le zone pedecollinari da Gambellara a Montorso e da Longare a Nanto con danni anche importanti. Da ieri, pur quanto non in modo stabile, la situazione è decisamente migliorata con maggiore escursione termica e massime in rialzo anche se ancora sotto la norma mentre le umidità relative sono decisamente alte ovunque.

Fase e andamento vegetativo: Varietà precoci: **pre-maturazione.** Varietà tardive: invaiatura. Anche in questa settimana l'avanzamento di fase è progredito molto lentamente. I test analitici di maturazione delle uve precoci rivelano comunque un anticipo di 7-10 gg. sullo scorso anno.

Stato sanitario: Peronospora: in tutti i comprensori e in particolare nei sistemi a pergola le reinfezioni proseguono senza sosta sulla vegetazione a mano a mano che si forma mentre sembra ormai, finalmente, terminato il rischio per le uve anche quelle tardive. **Botrite e Marciume acido:** presenza diffusa e virulenta su Pinot bianco e grigio soprattutto ma anche nelle aree grandinate più o meno recentemente. Le cv. precoci, in media, hanno grappoli con acini decisamente surdimensionati e bucce troppo fragili e cedevoli per non essere divorate da questi parassiti. **Tignoletta:** Anche in questa settimana le catture degli adulti di 3° sono state molto

disomogenee tra i comprensori. In generale sono molto contenute nel settore di Lonigo-Riviera berica mentre sono più numerose in quello di Alte-Montecchio M.

Difesa: La campagna degli interventi sulle cultivar precoci è di fatto terminata. A ben poco, se non a nulla, servono degli altri trattamenti contro i Marciumi laddove le situazioni sono già in parte compromesse. Solo il meteo ormai può dare una mano!

Sulle varietà medio tardive la difesa antiperonosporica-antioidica ed eventualmente antibotritica deve invece andare avanti e così pure nelle aree grandinate dove bisogna anche salvaguardare la nuova vegetazione a tutela della lignificazione dei tralci danneggiati. Il trattamento rameico consigliato ed eseguito entro il fine settimana scorso dovrebbe garantire ancora funzionalità più che sufficienti per le necessità contingenti in tutti i comprensori. **In ogni caso al verificarsi e/o in previsione di nuove precipitazioni bisognerà effettuare nuovamente una ricopertura con prodotti rameici ad alto dosaggio affiancati da uno zolfo.** Limitatamente alle varietà medio-tardive, negli ambienti dove la Tignoletta di 3° generazione è abitualmente causa di danno, valutare l'opportunità di rifare il trattamento indicato la scorsa settimana se quest'ultimo è stato dilavato dalle ultime precipitazioni. In tal caso impiegare prodotti a base di Indoxacarb (10 gg di carenza) o Emamectina benzoato (7 gg) o Metossifenozide (14 gg) o Tebufenozide (30 gg).

Si comunica che per la prossima settimana il bollettino verrà sospeso e riprenderà regolarmente giovedì 21 agosto