



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## VITE

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.19 DEL 21 AGOSTO 2014

**METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Giovedì:** Nuvolosità irregolare alternata a delle schiarite. Contenuto aumento della probabilità di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

**Venerdì:** Cielo: Condizioni di variabilità, con presenza a inizio giornata anche di nubi medio-basse e dal pomeriggio di nubi perlopiù cumuliformi, alternate a schiarite specie in pianura. Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%), per fenomeni locali e discontinui anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: In montagna saranno generalmente stazionarie o in leggero aumento specie nei valori minimi, altrove le minime saranno stazionarie o in contenuto calo e le massime subiranno un lieve aumento.

**Sabato:** Cielo: Frequenti addensamenti nuvolosi alternati a qualche schiarita, con delle fasi di instabilità. Precipitazioni: Da sparse a temporaneamente diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con probabilità medio-alta (50-75%). Temperature: In contenuto aumento, salvo risultare pressochè stazionarie nei valori minimi in montagna.

**Domenica:** Tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite anche ampie. Probabilità di qualche locale precipitazione, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature perlopiù in contenuto calo, salvo le massime in montagna che potranno localmente aumentare.

**Andamento meteo:** Ancora molto maltempo in queste due ultime settimane. Da giovedì 7 u.s. ad oggi sono caduti altri 60-80 mm in pedemontana e nei Lessini e 20-50 mm nel resto del territorio in 7-8 occasioni. In totale, dagli inizi di luglio, il quantitativo di pioggia ammonta a circa il triplo della norma in quasi tutte le località mentre la frequenza degli eventi piovosi lo è al doppio! Le temperature dell'ultima quindicina sono state più basse della norma di 2,5-3°C sui valori massimi mentre le minime, in questi ultimi giorni, sono scese fino a 13-14°C. Con gli acquazzoni di stanotte è giunta anche l'ennesima grandinata stagionale che ha colpito stavolta alcuni settori di piano e colle del Basso Vicentino tra Lonigo e Orgiano.

**Fase e andamento vegetativo:** Varietà precoci: raccolta avanzata nel medio-basso vicentino, ad inizio nella pedemontana. Varietà tardive: invaiatura avanzata. In tutti i comprensori e su tutte le varietà, e su Prosecco in particolare, la fase sta avanzando con estrema lentezza, più ancora delle precedenti settimane.

**Stato sanitario: Peronospora:** le reinfezioni sulla vegetazione terminale continuano senza interruzione ovunque. **Botrite:** l'estrema virulenza manifestata a partire da metà luglio è

certamente diminuita in quest'ultimo periodo ma rimane una minaccia molto seria e potenzialmente devastante anche sulle medio-tardive con questo andamento meteorologico. **Tignoletta di 3° gen:** tra giovedì e sabato u.s. c'è stato un nuovo e sensibile incremento di presenze di adulti. Tale riscontro tuttavia non è affatto omogeneo a livello territoriale.

**Difesa:** Negli ambienti dove la Tignoletta di 3° generazione è anche solo occasionalmente causa di danno impiegare, se non già eseguito la scorsa settimana, un insetticida specifico sulle cv. medio-tardive entro sabato 23 agosto con prodotti a base di Indoxacarb (10 gg di carenza) o Emamectina benzoato (7 gg) o Metossifenozide (14 gg) o Bacillus thuringiensis (3 gg). E' di fondamentale importanza che i grappoli siano ben esposti al trattamento e perciò, nei sistemi a parete, procedere dapprima e a necessità con una sfogliatura della fascia produttiva. In combinata potrebbe essere opportuno impiegare anche un antiperonosporico a base di rame ad alto dosaggio e/o un antibotritico specifico, meglio se a base dei vari Bacillus (subtilis ecc.) o di Bicarbonato di potassio. Nei vigneti grandinati dove bisogna salvaguardare la nuova vegetazione proseguire la difesa a turni stretti con prodotti rameici. **In tutti i casi fare attenzione ai periodi di carenza.**

**Prossimo bollettino giovedì 28 agosto**