



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## VITE

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.6 DEL 15 MAGGIO 2014

**METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Giovedì:** Ampi spazi di sereno, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità, pressochè ovunque per l'arrivo da est di nubi medio-alte e specie sui rilievi per locale attività cumuliforme. Rinforzi di vento dai quadranti settentrionali sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane, anche significativi in quota, con episodi di Foehn; in pianura venti a tratti moderati e a tratti deboli, dai quadranti settentrionali.

**Venerdì:** Cielo: Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, probabilmente più ampie verso fine giornata. Precipitazioni: Generalmente assenti. Temperature: Minime in lieve aumento; contenute variazioni di carattere locale nei valori massimi.

**Sabato:** Cielo: Tempo moderatamente variabile, con spazi di sereno alternati a nuvolosità più frequente sulle zone centro-settentrionali, specie dal pomeriggio. Precipitazioni: Specie a partire dalle ore centrali saranno possibili locali piovoschi o brevi rovesci, con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane, bassa (5-25%) altrove. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

**Domenica:** Tempo variabile, a tratti instabile, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi. Probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Contenute variazioni di carattere locale nei valori termici.

**SEGNALAZIONE METEO:** Fino a venerdì venti forti da Nord in quota; episodi anche intensi di Foehn, frequenti nelle valli e sulla fascia pedemontana e a tratti anche in alcune zone della pianura.

**Andamento meteo:** La turbolenza atmosferica che ha connotato il meteo da domenica a martedì ha permesso la formazione di alcuni estesi temporali che hanno interessato tutto il territorio provinciale con forte ventosità. Mediamente sono caduti da 10 a 25 mm di pioggia con qualche chicco di grandine. I fenomeni più violenti sono stati registrati nelle aree di collina della Pedemontana da Sarcedo a Mason V.no dove grandine e raffiche di vento hanno causato danni generalizzati e localmente intensi. Le temperature minime settimanali sono state inferiori alla norma di circa 1,5-2°C.

**Fase e andamento vegetativo:** Varietà a germogliamento precoce: inizio-piena fioritura. Varietà tardive: bottoni floreali ingrossati. Sensibile anticipo stagionale di 12 giorni sulla media trentennale e di 20 giorni sullo scorso anno. Marcata spinta vegetativa con notevole allungamento di germogli e grappoli. E' necessario e urgente assicurare la massa vegetativa entro i fili di contenimento ove previsti.

**Stato sanitario:** Ancora a tutt'oggi nessun ritrovamento di peronospora nei vigneti vicentini mentre solo qualche accenno di escoriosi nei vigneti storicamente colpiti. Il rilievo della presenza larvale di Tignoletta di 1° generazione compiuto presso alcuni vigneti altamente infestati lo scorso anno ha rivelato una bassissima presenza di nidi (2-3 su 100 grappoli) mentre sono state riscontrate le neanidi di 1°

generazione di *Planococcus ficus* già ad inizio settimana.

**Difesa:** L'ultimo trattamento antiperonosporico-antioidico consigliato entro sabato u.s. con prodotti di natura sistemica proteggerà gli organi vegetativi almeno fino a domenica-lunedì p.v.. In ragione di ciò è dato che successivamente non sono previste delle perturbazioni c'è modo di poter attendere qualche giorno prima di prendere decisione sul collocamento del quarto trattamento fungicida. **Per coloro che hanno subito forti attacchi di cocciniglia *Planococcus ficus*** nella passata stagione e laddove la fase fiorale debba ancora iniziare è opportuno intervenire celermente con un insetticida a base di Buprofezin. Nelle diffuse situazioni dove questo insetto è presente ma non ancora a livello di infestazione daremo le indicazioni appropriate appena terminata la fioritura. **Contro la tignola di 1° generazione non si consiglia alcun intervento specifico.** D'accordo con i Tecnici delle Cantine cooperative sorveglieremo attentamente la 2° generazione e daremo tutte le indicazioni necessarie per combattere efficacemente questo insetto anche ricorrendo, se necessario, a 2 interventi specifici e in successione.

Nelle aree grandinate non è necessario fare alcun trattamento "cicatizzante". Le condizioni meteo di questi giorni, soleggiate e asciutte, non sono certo favorevoli allo sviluppo della Botrite.

**Prossimo bollettino giovedì 22 maggio**