



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## VITE

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.9 DEL 5 GIUGNO 2014

**METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Giovedì:** Residua variabilità con tempo a tratti instabile; maggiori schiarite in pianura e nuvolosità più diffusa sui rilievi. Probabili precipitazioni sparse in montagna e locali in pianura, con qualche rovescio o temporale, tendenti a cessare in serata.

**Venerdì:** Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo nubi basse al mattino a ridosso dei rilievi, e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani specie in montagna. Precipitazioni: Generalmente assenti, anche se non si esclude qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Temperature: Massime in lieve aumento, minime stabili in pianura e in lieve calo in montagna.

**Sabato:** Cielo: Tempo perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento più probabile dalle ore centrali in montagna. Precipitazioni: Sui rilievi probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci nella seconda parte della giornata; precipitazioni assenti in pianura. Temperature: In generale aumento, specie le massime, fino a valori di qualche grado superiori alle medie del periodo.

**Domenica:** Tempo in prevalenza stabile e soleggiato con cumuli pomeridiani specie sui rilievi. Temperature in aumento, specie le massime, con valori estivi e clima caldo.

**Andamento meteo:** In quest'ultima settimana sono caduti da 15 a 30 mm di pioggia pressoché ovunque in Provincia con punte di 40-50 mm a Montegalda e Trissino. Nella giornata di venerdì 29 maggio alcune celle grandinogene hanno flagellato i territori nei comprensori di Trissino-Montorso-Montebello-Gambellara e di Camisano-Montegalda. Nelle situazioni peggiori i vigneti hanno subito danni molto consistenti che secondo prime valutazioni si aggirano sull'80% della produzione. Le temperature settimanali sono state inferiori di 1-2°C rispetto alla norma.

**Fase e andamento vegetativo:** Varietà precoci: prechiusura grappolo. Varietà tardive: allegagione-inizio ingrossamento acini. La spinta vegetativa procede in modo sostenuto ovunque. Le masse verdi sono assai rigogliose ed è pertanto necessario portare a completamento le operazioni di posizionamento dei fili e di cimatura necessarie per il loro contenimento. Negli impianti vigorosi di cv. precoci allevati a spalliera è opportuno sfoltire la boscosità nella fascia produttiva con una leggera sfogliatura.

**Stato sanitario:** Peronospora: ad oggi nessun ritrovamento degno di nota. Oidio: i primi sintomi sia su foglia che su acino sono stati notati in questa settimana. Questo parassita è stato fin qui favorito dalle condizioni ambientali ed è senza dubbio quello più pericoloso in prospettiva.

Tignoletta: la 1° generazione è di fatto conclusa. La presenza dell'insetto, verificata con conta dei nidi presso aziende fortemente infestate lo scorso anno, è stata molto bassa (meno di 15 su 100 grappoli). La prossima settimana inizieranno i voli degli adulti di 2° generazione. E' in pieno svolgimento la migrazione delle neanidi di *Partenolecanium corni* mentre è pressoché terminata quella di *Planococcus ficus*.

**Difesa:** E' necessario **eseguire un trattamento a valenza multipla in tutti i vigneti vicentini**. Nella zona pedemontana sono indicati prodotti antiperonosporici curativi accoppiati a rame o folpet mentre in tutti gli altri comprensori solo prodotti rameici (o il Folpet sulle cv. precoci se non si impiegano antibiotritici specifici). L'antioidico da affiancare è uno zolfo bagnabile ad alto dosaggio (600-700 gr/hl). In questa occasione va anche impiegato un insetticida contro le **cocciniglie e la cicalina della FD** preferibilmente a base di Buprofezin o Thiametoxam.

Successivamente a questo, sulle cv. precoci a grappolo compatto e buccia sottile, **eseguire il consueto intervento di prechiusura con un antibiotritico specifico**.

Nelle zone pesantemente colpite dalla grandine è necessario stimolare la ricrescita vegetativa e perciò d'ora in poi si dovranno impiegare prodotti acuprici contro la peronospora.

**Prossimo bollettino giovedì 12 giugno**