



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



CILIEGIO

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 1 DEL 20 MARZO 2014

METEО VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Sereno o poco nuvoloso. In pianura dopo il tramonto foschie con probabili nebbie durante la notte specie sulle zone meridionali ed in prossimità della costa.

Venerdì: Cielo: Nella prima parte della giornata sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Fino al primo mattino foschie in pianura e nelle valli con probabili nebbie specie sulle zone meridionali ed in prossimità della costa. Da metà pomeriggio moderata intensificazione della nuvolosità. Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità molto bassa di qualche locale fenomeno dalla serata sulla pianura occidentale. Temperature: In leggera diminuzione.

Sabato: Cielo: Da parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata a nuvoloso o molto nuvoloso in seguito. Precipitazioni: Fino a metà giornata probabilità bassa (5-25%) di qualche locale precipitazione. In seguito probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone centro-settentrionali, dove i fenomeni saranno da sparsi a diffusi, medio-alta (50-75%) su quelle meridionali, dove le precipitazioni saranno più sporadiche e localizzate. Limite della neve intorno ai 1500-1800 m. Temperature: Massime in diminuzione, specie sulle zone montane; minime in diminuzione in quota, in aumento altrove.

Domenica: In prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibilità di qualche schiarita nella seconda parte della giornata. Precipitazioni anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, sparse in pianura, diffuse sulle zone montane e pedemontane dove potranno risultare consistenti. Venti dai quadranti meridionali anche forti in quota e sostenuti in prossimità della costa. Temperature massime in calo, con limite della neve in abbassamento fino a 900-1200 m a fine giornata.

Con questa settimana il Servizio di difesa integrata ha ripreso l'attività di monitoraggio nei comprensori della Pedemontana e dei Berici.

Andamento meteo-climatico: il periodo autunno-invernale (dal 1/10/2013 al 28/2/2014) si è caratterizzato per l'elevata piovosità e per le temperature al di sopra della media. In particolare nel medio alto vicentino sono caduti 1000 mm di pioggia contro i 500 mm della media ventennale e nel Basso Vicentino 650 – 750 mm contro i 300-400 mm. Per quanto riguarda le temperature medie, queste sono state in generale più alte di circa 1°C in autunno e di 3°C nel periodo invernale. Le temperature massime e minime del mese di marzo son state superiori di 2-3°C rispetto alla media del periodo, con punte assolute di 21°C.

Fase fenologica: varietà precoci e medie: da bottoni fiorali visibili ad inizio fioritura; varietà tardive: gemma gonfia. Nel comprensorio dei Berici, negli impianti di collina meglio esposti, i primi fiori aperti sono stati osservati tra sabato e domenica scorsi, con un anticipo stagionale di circa 10-15 giorni sulla media; negli ultimi vent'anni solo nel 2007 l'inizio fioritura è stato così anticipato (15 marzo).

Prossimo bollettino giovedì 27 marzo

Pratiche colturali: considerata la notevole azione di dilavamento dei suoli e la conseguente perdita di gran parte della componente azotata per lisciviazione è opportuno provvedere in questa fase ad una integrazione di concimazione nitrica per favorire la fase fiorale.

Difesa: si consiglia di intervenire al più presto nei confronti del **Corineo** con prodotti a base di Ziram o Thiram. Questi prodotti possono essere sostituiti su varietà tardive a gemma ingrossata con prodotti rameici, validi anche contro la batteriosi del ciliegio (*Pseudomonas syringae*). Se le previsioni meteo della prossima settimana dovessero annunciare condizioni di tempo umido-piovoso, bisognerà effettuare tempestivamente e prima dell'evento piovoso un intervento fungicida contro la **Monilia** con prodotti a base di Iprodione o Fenexamid o Fenbuconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o Boscalid+Pyraclostrobin o Boscalid o Cyprodinil+Fludioxonil.

Massima attenzione: durante il periodo fiorale è vietato eseguire trattamenti insetticidi e/o con prodotti tossici alle api.

Tutti i consigli relativi alla difesa della coltura si fondano sulle "Linee tecniche di difesa integrata 2014" e successive integrazioni della Regione Veneto (<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata>) e sono perciò conformi alle disposizioni del D.Lgs 150/2012 ("Difesa Integrata Obbligatoria"). Si fa presente che, in ogni caso e a prescindere dalle indicazioni, l'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve sempre rispettare le indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto (dosi di impiego, tempi di carenza, numero massimo di interventi, intervallo tra un trattamento e l'altro ecc.)