



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



CILIEGIO

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 3 DEL 3 APRILE 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo possibilità di qualche temporanea parziale schiarita specie in serata.

Venerdì: Nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite specie sulle zone montane. Precipitazioni: probabilità generalmente bassa (5-25%) di qualche modesta precipitazione, anche medio-bassa (25-50%) sulla pianura meridionale. Temperature: minime in lieve aumento in pianura, in calo in quota; massime in aumento in quota, in contenuta diminuzione in pianura.

Sabato: Fino al primo mattino residua nuvolosità, piuttosto compatta soprattutto in pianura; in seguito crescenti schiarite alternate a nuvolosità cumuliforme pomeridiana specie in prossimità dei rilievi. Precipitazioni: probabilità bassa (5-25%) di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio, anche medio-bassa (25-50%) al pomeriggio su zone montane pedemontane e pianura meridionale. Temperature. Minime in calo in quota e nelle valli, massime in aumento.

Domenica: Sereno o poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme pomeridiana specie a ridosso dei rilievi. Temperature senza notevoli variazioni, ma con tendenza a lieve calo nelle minime e leggero aumento nelle massime.

Andamento meteo-climatico: La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dal bel tempo, con temperature al di sopra della media stagionale di circa 4°C per le massime e di 1°C per le minime.

Fase fenologica: varietà precoci e medie: da caduta petali ad allegagione; varietà tardive: piena fioritura. Il rialzo delle temperature a partire dal 28 marzo ha accelerato l'avanzamento dello stadio fenologico in tutte le situazioni aumentando ulteriormente, sia pur di poco rispetto al 2007, l'anticipo stagionale.

Situazione fitosanitaria: In alcuni ceraseti di fondo valle o solo parzialmente soleggiati del Comprensorio dei Berici, il prolungato periodo di bagnatura da rugiada ha favorito lo sviluppo, peraltro contenuto a livello di comparsa, della **Monilia** sui fiori. La presenza di **Corineo** su

foglia è del tutto occasionale. Sono state posizionate alcune trappole per il monitoraggio del **moscerino** *Drosophila suzukii* nel Comprensorio Pedemontano e Berico. A partire dalla prossima settimana e fino alla raccolta daremo notizia dell'evoluzione e dell'entità delle catture.

Difesa: Per quanto riguarda la **Monilia**, nelle particolari predette situazioni, anche in ragione delle condizioni di instabilità meteo previste per i prossimi giorni, è opportuno eseguire un intervento fungicida preferibilmente con prodotti a base di Fenbuconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o Fenexamid o Boscalid + Pyraclostrobin o Cyprodinil+Fludioxonil. Si ricorda che durante il periodo della fioritura è vietato eseguire trattamenti insetticidi.

Prossimo bollettino giovedì 10 aprile