



CILIEGIO

BOLLETTINO SPECIALE DEL 15 MAGGIO 2014

Calendario di lotta contro Drosophila suzukii sulle varietà medio tardive

La difesa contro la Drosophila suzukii sulle varietà medio-tardive è sostanzialmente basata sull'impiego di vari insetticidi a rotazione e a calendario. Attualmente solo lo Spinetoram (Delegate) è stato registrato temporaneamente e specificatamente contro questo parassita sulla coltura del ciliegio mentre gli altri che pur hanno dimostrato una certa efficacia sono normalmente impiegati contro gli Afidi e/o la Mosca.

La tabella sottostante è stata predisposta per offrire ai cerasicoltori un esempio concreto di calendario di lotta da seguire per contenere il più possibile questo pericolosissimo nemico.

Calendario di difesa contro *Rhagoletis cerasi* e *Drosophila suzukii* su cv. medio-tardive con sostanze attive indicate dalle Linee Tecniche Regionali 2014 e successive deroghe

N. intervento	Sequenza dell'intervento (gg)	Principio attivo	Esempi di Formulati commerciali	Periodo di efficacia (gg)	Intervallo di sicurezza (gg)	Modalità d'azione	Impiego registrato per:
1	0 (1)	Acetamiprid	EPIK	5	14	sistemico	mosca
2	+ 8	Fosmet (2)	IMIDAN WDG, SPADA 200EC, SUPRAFOS EC	8	10	citotropico	mosca
3	+ 17	Spinetoram	DELEGATE WG	7	7	copertura	drosophila
4	+ 25	Deltametrina	METEOR, DELTASAP	3	3	copertura	mosca

- (1) è il giorno di esecuzione del primo trattamento contro la Mosca
(2) Fosmet può provocare fitotossicità (leggere attentamente le indicazioni d'uso)

FARE MOLTA ATTENZIONE AGLI INTERVALLI DI SICUREZZA RIPORTATI IN ETICHETTA