



SOS CAVALLETTE

BOLLETTINO N. 11 DEL 12 GIUGNO 2014

1. *Barbitistes vicetinus*

Le popolazioni di *Barbitistes vicetinus* non hanno raggiunto livelli di guardia nel territorio. Solo in qualche isolato caso si sono verificate densità elevate, peraltro risolte senza danni di rilievo.

2. *Calliptamus italicus*

Continuano le schiuse in tutto il territorio da circa un mese. E' evidente la scalarità delle nascite ed è possibile vedere assieme individui neonati (4-5 mm di lunghezza) con individui di 15-20 giorni di vita (lunghezza 1 cm o più) (figura 1).



Figura 1: Individui di *Calliptamus italicus* di diverse dimensioni, a causa delle schiuse avvenute a distanza di qualche giorno

Per contenere le pullulazioni si raccomanda di eseguire un trattamento immediato sulle aree di schiusa (grillare) presso le quali si concentrano gli individui, anche diverse decine in pochi metri quadri. L'insetticida dovrà essere a base di Spinosad o Deltametrina e, per quanto possibile, distribuito in modo localizzato alle sole grillare. Il trattamento potrà essere ripetuto in caso di ricomparsa degli insetti dopo qualche giorno.

Si ricorda che le grillare sono individuabili in quanto localizzate in aree con caratteristiche costanti:

- Terreni esposti a sud e soleggiati
- Terreni aridi
- Terreni non lavorati
- Terreni con vegetazione povera

Si ribadisce che il tempismo dell'intervento è un fattore fondamentale per contenere le pullulazioni ed è perciò importante sensibilizzare il maggior numero possibile di persone (anche vicini, confinanti etc.) a monitorare i propri terreni ed eseguire quanto sopra detto.



Figura 2: Individuo di *Calliptamus italicus*. I lati dei quadrati di sfondo hanno i lati di 0,5 cm di lunghezza

Prossimo bollettino giovedì 19 giugno