



SOS CAVALLETTE

BOLLETTINO N. 13 DEL 26 GIUGNO 2014

1. *Calliptamus italicus*

Le popolazioni di *Calliptamus italicus* continuano a svilupparsi e ad aumentare di densità a causa del proseguire delle schiuse. La presenza di questa specie è ormai verificabile in gran parte dell'area Berica, in alcuni casi in quantità notevoli.

Nella fascia meridionale dei colli Berici, particolarmente nei comuni di Villaga, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici, Alonte, Orgiano e Sossano, si evidenzia la presenza di individui adulti (Figure 1 e 2).



Figura 1: Adulto di *Calliptamus italicus*

Gli individui che raggiungono l'età adulta risultano più problematici da controllare in quanto iniziano a muoversi e ad allontanarsi dai siti di schiusa formando dei gruppi numerosi, in particolare questi gruppi si allontanano dalle aree con vegetazione secca o scarsa per nutrirsi in aree più verdi, creando dei problemi a prati e orti in particolare.



Figura 2: Adulto di *Calliptamus italicus*. Nella fase di volo sono visibili le ali dalla caratteristica colorazione rosa.

I trattamenti per il contenimento di *Calliptamus italicus* vanno eseguiti immediatamente con prodotti a base di Spinosad o deltametrina e – per quanto possibile – limitati alle aree di presenza degli individui.

Si sottolinea che i trattamenti, per quanto di sperimentata efficacia, non sono risolutivi in un solo intervento ma vanno ripetuti a distanza di 5-7 giorni per contrastare la comparsa degli individui neonati; le schiuse, infatti, continueranno ancora per qualche settimana.

Prossimo bollettino giovedì 3 luglio